

2005

立教大学理学部物理学科  
理学研究科物理学専攻

研究案内



## 卷頭言

この「研究案内」には、物理学科および大学院物理学専攻における研究の内容が簡単に紹介されています。物理学教室の3研究室（理論物理学、原子核・放射線物理学、宇宙地球系物理学）ごとに、研究室全体の紹介に続いて、各研究グループの研究内容が解説されています。さらに2001年度からの5カ年計画で進行中のハイテクリサーチセンタープロジェクトの紹介も掲載されています。

学生の皆さんには、学部では講義、演習、実験という形で教育を受けますが、学部4年次の卒業研究および大学院では実際の研究活動に参加します。私たち教員は、多くの皆さんに、自分がもっとも興味を持っている分野の研究に参加し、その面白さや厳しさとともに実感してもらいたいと願っています。しかし、皆さんが大学で行われている研究を知る機会が数多く提供されているわけではありません。この小冊子が皆さんの卒業研究のテーマ選択や大学院進学の参考になれば幸いです。

この「研究案内」を読んで興味や疑問を持ったときには、是非研究室に足を運んで、教員や学生に質問したり研究の様子を見学されることを勧めます。教室での講義・学生実験室での実験とは全く違った世界をかいだ見ることができるはずです。

最近では企業の研究的な職種につくためには大学院博士前期課程(修士課程)修了が条件となります。その意味でも、私たちは多くの皆さんに大学院に進学されることを期待しています。

物理学科ホームページ：<http://www.rikkyo.ac.jp/grp/dept-phys/>

物理学科長 平山孝人


# 研究紹介

# 理論物理学研究室

素粒子物理と宇宙物理の理論、対象、テーマ、人。

いろいろと興味ある問題がたくさんあります。

いつでも、誰でも、質問・議論に来てください。



|                      |          |                      |         |
|----------------------|----------|----------------------|---------|
| first star formation | 牧(宇D2)   | gauge/string duality | 知崎(素D2) |
| galaxy formation     | 米谷(宇M2)  | de Sitter-black hole | 関和(素D2) |
| $\gamma$ -ray burst  | 佐藤(宇M2)  | grand unification    | 若林(素D2) |
| AGN                  | 佐久間(宇M1) | QCD, proton          | 川嶋(素D2) |
| galaxy formation     | 佐藤大(宇M1) | D-brane              | 三宅(素M2) |
| neutron stars        | 山下(宇M1)  | instanton            | 秦(素M2)  |
|                      |          | quantum field theory | 鈴木(素M1) |
|                      |          | QCD, proton          | 松田(素M1) |
|                      |          | quantum field theory | 高橋(素M1) |

## **[研究室の概要]**

理論物理学研究室では、素粒子理論と宇宙物理学の理論的研究を行っています。物質の構造を探る素粒子論と広大な宇宙で起こる現象を取り扱う宇宙物理学の分野とは一見すると対極に位置するように思えるかもしれません。しかし、現代物理学では、物質の由来を宇宙創生や星の誕生と終焉に求め、宇宙の成り立ちは物質構造の知識を抜きでは知りえないことを教えてくれます。つまり、自然界の成り立ちと構造を知るためにには、この2つの分野は不可欠な役割を担っているのです。

当研究室には、6名のスタッフと15名の大学院生が所属しています。また、卒業研究で理論物理学を選択した4年次生も加わって研究活動を行っています。

スタッフと大学院生の研究分野は以下のページで詳しく説明されていますが、研究分野の概略のみを記すと以下のようにになっています。

- |       |  |
|-------|--|
| 藤崎晴男  | 宇宙頂・ブラックホールの超弦熱力学。   |
| 柴崎徳明  | 中性子星やブラックホールを対象とする高エネルギー天体物理学の理論的研究。                         |
| 田中秀和  | 素粒子反応の理論的研究。特に、高エネルギー素粒子反応を通して物質構造を理論的に解明することを目指しています。       |
| 矢彦沢茂明 | 超弦理論・M理論の構築。   |
| 須佐 元  | 宇宙初期の天体形成および銀河形成の理論的研究。特に数値シミュレーションの手法を用いて研究を行っています。         |
| 大須賀 健 | 活動銀河中心核の理論的研究。特に、銀河中心に存在する超巨大ブラックホールの形成および進化を解明する事を目的としています。 |

# 素粒子論・宇宙論を中心とする理論物理学

藤崎晴男

研究課題：超弦熱力学・共形場理論を中心とする素粒子論

1. Newton 以来 300 年の蓄積のある理論物理学は、Einstein の”物理学の幾何学化”の精神に沿って統一されようとしている。このことは単に自然界の 4 つの型の基本的相互作用＜強・電磁・弱・重力相互作用＞の量子論での統一可能性を意味するのではなく、古典論＜マクロ物理学＞と量子論＜ミクロ物理学＞を同時に視野にとらえることの重要性を示唆している。超弦理論は 4 つの基本的相互作用を記述する統一理論の候補として湯防止されている。その最大の特徴は古典論の対称性をそこなわない量子化が臨界時空次元で実現することにある。そこでは因果律およびユニタリー条件の他に、双対性が本質的役割を果たす。
2. 超弦理論は無次元の基本パラメーターは含まず、全ての物理現象を 2 次元曲面の相対論的・量子論的幾何学に還元して記述する。任意パラメーターとしては、相対論の要請からの光の速さと量子化にともなう”最短の長さ”が基本的に残る。通常の質点系の量子化とは著しく異なり、Planck 定数や Newton 重力定数は重力の量子論に特徴的な Planck 長を通じて登場する。このことは、Heisenberg 不確定性関係そのものの拡張とその背後にある新たな対称性の存在を示唆している。昨今大流行の Dirichlet p-brane パラダイムの本質はここにある。
3. マクロ現象としての熱効果をミクロ論理である量子論の形式で直接取扱うことのできる処方箋が梅沢博臣達により開発され、TFD 形式の名の下に、通常の場の理論のみならず弦模型および超弦模型にも適用され、くりこみ可能性の熱的安定性に基づく着実な成果が奉公されている。
4. 我々はすでに TFD 開弦模型において、双対性の熱的安定性を陽に示すとともに、有限温度での超対称性の破れは Hagedom 温度以下では漸近的に無視しうること、熱的ゆらぎ効果は量子論的ゆらぎ効果を抑止し発散の次数を下げ、かつ解析領域を拡大する機能をもつうこと、およびその機能には臨界温度が存在することなどを明らかにした。
5. 我々はさらに TFD 開弦模型において、有限温度でもモデュライ不变な宇宙項を構成し、熱的相反性による解析領域の拡大を陽に示した。とくに低エネルギー極限での自己エネルギー振幅について考察し、有限温度でもモデュライ不变な振幅を建設した。さらに低エネルギー一定理と因子分解性の帰結として自己エネルギー振幅の宇宙項による表現を陽に導いた。
6. 我々はひきつづきボソニック閉熱弦模型での TFD 宇宙項の相転移を検討し、カノニカル相、

ミクロ・カノニカル相、双対ミクロ・カノニカル相および双対カノニカル相の存在を確認すると同時に、自己双対温度は分岐点特異性を形成することにより最大臨界温度を設定していることを示した。

7. 我々は新たにヘテロティック閉熱弦模型において、有限温度でもモデュライ不变な TFD 次元正則化法を開発し、熱的相反性を満たす TFD 宇宙項を陽に構成した。とくに相転移について考察し、カノニカル相、自己双対ミクロ・カノニカル相および双対カノニカル相が存在するにもかかわらず、自己双対温度は特異点を形成せず、最大臨界温度の値は双対 Hagedom 温度にまで上昇しうることを示した。
8. 我々はすでに通常の 4 次元真空時空でのブラックホール熱力学をミクロ・カノニカル・アンサンブル法で記述し、最も実現性の高い多体 Kerr-Newman 型ブラックホール分布は全系の質量・荷電・角運動量が 1 コのブラックホールに集中した非熱平衡状態であることを確認し、ミクロ・カノニカル最大臨界温度の存在可能性とその物理的意味につき考察した。
9. 我々はさらに反 de Sitter 真空時空でのブラックホール熱力学をミクロ・カノニカル・アンサンブル法で考察し、Kerr-Newman 型ブラックホール多体系は任意の有限温度で熱平衡分布を実現しミクロ・カノニカル臨界温度は存在しないことを示した。
10. 我々はひきつづき通常の 4 次元真空時空でのディラトン結合型ブラックホール熱力学をミクロ・カノニカル・アンサンブル法で検討し、最も実現性の高い多体ブラックホール分布はモデルの詳細によらず全系の質量・荷電・角運動量が 1 コのブラックホールに集中した非熱平衡状態であることを示した。
11. 今後の課題としては、超弦相転移を一般的枠組で議論し、臨界温度、臨界時空次元ならびに古典論時空次元そのものの熱力学的意味を調べる。この過程で熱的ゆらぎと量子論的ゆらぎとが共存する系での最も一般的な形での不確定性関係が確立される。そのときには、ミクロな場の量子論とマクロな熱力学との幾何学的対応関係が解明され、温度概念のみならず”最短の長さ”の時空幾何学的起源がはじめて理解される。こうして Einstein の意図した”物理学の幾何学化”は熱的効果をも含めて古典論と量子論との幾何学的対応関係の統一的記述により完成する。

我々の研究目的は、超弦熱力学・共形場理論に基づき”物理学の幾何学化”を確立し、宇宙の根本法則を解明することである。

採録人名辞典：Who's Who in the World; Who's Who in the 21th Century; Outstanding Intellectuals of the 20th Century; Eminent People of Today

補 : Fuj. School OB 現況等

|    |        |                                      |
|----|--------|--------------------------------------|
| イ. | 塚原周信君  | 理学博士（立教大学）【素粒子理論】・京都能開短大助教授          |
|    | 武藤重治君  | 理学博士（立教大学）【素粒子理論】                    |
|    | 故・梁成吉君 | 理学博士（立教大学）【素粒子理論】・筑波大学教授             |
|    | 近匡君    | 理学博士（立教大学）【素粒子理論】・成蹊大学工学部教授          |
|    | 中川弘一君  | 理学博士（立教大学）【素粒子理論】・星葉科大学助教授           |
|    | 阿野成晃君  | 理学博士（立教大学）【素粒子理論】                    |
|    | 松浦弘幸君  | 理学博士（立教大学）【素粒子理論】・医学博士（東京大学）         |
| ロ. | 関口真木君  | 理学博士（筑波大学）【素粒子実験】・（元）東京大学助教授         |
|    | 鈴木貴君   | 理学博士（筑波大学）【素粒子理論】・広島工大助教授            |
|    | 加藤英之君  | 理学博士（都立大学）【素粒子理論】・New York Univ. 研究員 |
|    | 近松健君   | 理学博士（筑波大学）【素粒子実験】・宮城学院女子大助教授         |
|    | 野崎真利君  | 理学博士（東京大学）【素粒子理論】                    |
|    | 小林博和君  | 理学博士（筑波大学）【素粒子実験】（見込）                |
|    | 道正新一郎君 | 理学博士（東京大学）【原子核実験】（見込）・理研研究員          |
|    | 田代徹君   | 東京大学大学院生 【計算物理】                      |
|    | 中村庸介君  | 筑波大学大学院生 【素粒子理論】                     |

# 素粒子反応の理論的研究

田中秀和

物質は何で出来ているのだろうかという古代からの素朴な疑問に対して、人類は現時点までに、「物質はクォークとレプトンで出来ており、それらの間の相互作用はゲージ粒子とよばれる粒子によって媒介されている」という物質像にまでたどり着いた。これは「素粒子の標準理論」とよばれているが、物質界や宇宙の現象を理解するための最も基礎的な理論体系の一つである。この標準理論の知識は、原子核物理学や宇宙物理学の基本的な知識ともなってきてるので、更にその重要性を増してきている。

しかし、標準理論が物質の究極の姿を全て説明してくれるわけではなく、もっと深いレベルでの構造の反映であろうと考えられている。例えば、従来の標準理論では質量を持たない粒子として取り扱われていたニュートリノは、近年の研究から質量を持っているであろうと考えられるようになってきた。また、素粒子の質量の起源と考えられているヒッグス機構や素粒子の世代についても、多くの不明な点が残されている。

この様な物質構造の研究は、理論的な研究と実験的な検証とによって進められている。理論的な研究としては、素粒子の標準理論が成立する起因をより深く理解するための統一理論の構築の試みなどと共に、複雑な素粒子反応がどこまで標準理論によって説明可能かを探る試みが挙げられる。素粒子の標準理論の枠組みは、学部4年次生でも（ちゃんと勉強すれば）理解できる体系であり、この分野は卒業研究で取り組むことも可能である。

以上の観点より、現在次のような研究を行っている。

## (1) 標準理論の検証

ニュートリノの質量を考慮した素粒子の標準理論は、現在実験との比較に於いて非常に良い精度で成り立っていることが知られているが、どこまでの精度で成立しているかは明らかではない。これを調べるためにには、素粒子反応の精密測定が必要であるが、その結果を評価するためには、標準理論の精密計算を行い測定結果と比較する必要である。

しかし、素粒子反応の精密計算は計算量が膨大になるものが多く、手計算で行うには限界がある。そこで、現在、高エネルギー加速器研究機構や他大学と協力をして、素粒子反応過程の理論計算の自動計算化を行い、標準理論の精密計算を行っている。

## (2) ハドロンの内部構造と高エネルギーハドロン散乱における強い相互作用の効果

原子核を構成する陽子や中性子などの強い相互作用をする粒子（ハドロン）は、クォークと

強い相互作用を媒介するグルーオンの複合体と考えられているが、その内部構造は非常に複雑であり、未だに全貌は明らかではない。

例えば、陽子の持つスピンはクォークのスピンのみでは説明できないし、ハドロン間の相互作用はクォークやグルーオンのレベルで完全に理解できているわけではない。このように、強い相互作用の基本法則は理解されつつあるが、その複合体であるハドロンや原子核を標準理論で理解するためには、更なる研究が必要である。

ハドロンの内部構造の探索は、主にハドロン散乱反応を用いて行われる。実験的には、終状態に多数のハドロンが生成される複雑な現象の解析が必要であり、理論的に厄介なことは、強い相互作用は単純な結合定数の有限次数での展開では不十分であることが知られている。

そこで、強い相互作用による多粒子生成機構の解明と、その知識を用いてハドロンの内部構造やハドロン散乱現象の理論的研究を行っている。

### (3) 素粒子の標準理論を超える試み

素粒子の標準理論には、素粒子の質量、相互作用の強さ、相互作用を支配する対称性などの起源についての理論的に色々な疑問が内包されている。また、現在の標準理論の枠組みは、超高エネルギー領域では破綻をきたすことが示唆されており、現在実験が行われているエネルギーよりも高いエネルギー領域には新たな物理法則が存在していると考えられている。また、宇宙初期などを考える時には、素粒子の標準理論だけでは不十分であることが示唆されている。

これらの問題を解決するために様々な統一理論が提唱されているが、その中でも有望な超対称性を持つ統一理論についての研究を行うと共に、「次世代の超高エネルギー加速器では何が起こりそうか?」について理論的な研究を行っている。

#### 最近の研究成果

##### ○ 超対称粒子の関与する散乱断面積の自動計算システムの研究・開発

素粒子の統一理論の枠組みとして有望視されている超対称性理論で予言される粒子の数は非常に多く、これらの粒子生成断面積を理論的に計算するのは多大な労力が必要である。そこで、先に開発した素粒子の標準理論に対する散乱断面積の自動計算システムを、超対称粒子の関与する散乱過程も計算可能な形に拡張した。

[発表論文]

GRACE/SUSY Automatic Generation of Tree Amplitude in MSSM

J. Fujimoto, T. Ishikawa, M. Jimbo, T. Kaneko, K. Kato, S. Kawabata,

T. Kon, M. Kuroda, Y. Kurihara, Y. Shimizu and H. Tanaka

Comput. Phys. Commun. 153(2003), pp. 106-134

○ ハドロン-ハドロン散乱における多粒子生成過程のモンテカルロアルゴリズムの研究

ハドロン-ハドロン散乱過程における量子色力学の効果は非常に複雑であり、これに対して理論的に整合性のあるシミュレーションを行うことが必要である。ここでは、散乱素過程に対する next-to-leading order の散乱振幅を考慮したモンテカルロジェネレータの研究・開発を行った。特に、始状態パートンに対するパートンシャワー生成との整合性を議論した。

[発表論文]

QCD event generators with next-to-leading order matrix-elements and parton

showers

Y. Kurihara, J. Fujimoto, T. Ishikawa, K. Kato, S. Kawabata, T. Munehisa  
and H. Tanaka

Nucl. Phys. B654 (2003), pp. 301-319

○ 始状態パートンに対する3体分岐関数の計算

強い相互作用の効果は、有限次数の摂動計算では精度良く評価できないことが知られている。この場合は、対数的な寄与を摂動の全次数について足しあげる必要があるが、このような効果の非包含過程に対する計算手法の研究が必要である。非包含過程に対して量子色力学の高次効果を加えるために、Jet Calculus の手法を用いて、これまでに求められていなかった始状態のパートンに対する全ての分岐素過程に対する3体分岐関数の計算を行い、その性質を調べた。

[口頭発表]

「Space-Like Jet Calculus による3体グルーオン分岐関数の計算」

杉浦哲哉、田中秀和、宗久知男、加藤潔

(日本物理学会第56回年次大会、2001年3月27-30日、中央大学多摩キャンパス)

「Space-Like Jet Calculus による3体分岐関数の計算」

杉浦哲哉、田中秀和、宗久知男、加藤潔

(日本物理学会2001年秋季大会、2001年9月22-25日、沖縄国際大学)

[発表論文]

Three-Gluon Decay Function Using Space-Like Jet Calculus Beyond the Leading Order

H. Tanaka, T. Sugiura, T. Munehisa and K. Kato

Prog. Theor. Phys. Vol. 105, No. 5 (2001) p. 827-p. 843

Space-Like Jet Calculus for Single Gluon Radiating Processes

H. Tanaka, T. Sugiura, T. Munehisa and K. Kato

Prog. Theor. Phys. 109(2003), pp. 981-993

○ 始状態パートンに対する分岐素過程の高次効果を含めたモンテカルロアルゴリズムの研究

散乱素過程に対して、next-to-leading order まで考慮する場合には、場の理論における摂動理論の整合性から、始状態パートンに対しては、next-to-leading-log(NLL) まで考慮する必要がある。ここでは、始状態パートンからの量子色力学効果による多粒子生成過程に対して、NLL 項までを考慮したモンテカルロアルゴリズムの研究・開発を行った。

[発表論文]

Initial State Parton Evolution beyond the Leading Logarithmic Order of QCD

Prog. Theor. Phys. 110(2003), pp. 963–973

H. Tanaka

[口頭発表]

「NLL 項を考慮した始状態パートンに対する QCD カスケード」

田中秀和（日本物理学 2003 年秋季大会宮城ワールドコンベンションセンター・サミット、2003 年 9 月 9–12 日）

「NLL parton shower for initial state parton radiation」

H. Tanaka (Physics Simulation for LHC, 5–6 April 2004 at KEK, Tsukuba)

○ 左右対称な中間対称性のある超対称 SO(10) 統一模型の研究

現在の素粒子物理学は標準模型というゲージ理論が基礎理論となっている。標準模型で解決されない問題を乗り越えるひとつの方法として SUSY SO(10) GUT があり、神岡で明らかにされたニュートリノが質量をもつ事実を理論的に説明可能なモデルの候補である。SO(10) 対称性を標準模型のそれに破る最も簡単な方法は Higgs 機構を繰り返すことだが、その破り方は任意ではなく、GUT に課せられる境界条件を満たす解の有無を数値計算によつて解析した。

[口頭発表]

「左右対称な中間対称性のある超対称 SO(10) 統一理論の繰り込み群解析」

若林裕也（日本物理学会 2004 年秋季大会、高知大学、2004 年 9 月 27–30 日）

研究指導

○ 博士課程後期課程（博士論文題目）

• 2002 年度

「Properties of Three-Body Decay Functions Derived with Time-Like Jet Calculus beyond Leading Order」

• 2004 年度

「Atomic Schwinger-Dyson in Finite Systems」（藤崎晴男教授より指導引継ぎ）

○ 博士課程前期課程（修士論文題目）

- 1998年度  
「ニュートリノ質量と大統一理論」（浜満教授との共同指導）
- 1999年度  
「始状態クォークの3体分岐関数の計算」
- 2002年度  
「Two Higgs doublet model(type III)と lepton flavor violation」
- 2003年度  
「深非弾性散乱における2ジエットのスピン依存性」  
「(non-)SUSY SO(10)GUT とその中間対称性」
- 2004年度  
「Drell-Yan過程におけるQCDの効果とその近似解法の妥当性」

(\*) 1998年度—2004年度修了者 6名（博士後期課程進学者 3名）

○ 卒業研究（卒業論文題目）

- 1998年度  
「電弱理論におけるHiggs粒子崩壊過程の現象論的考察」
- 1999年度  
「電子-陽電子散乱におけるHiggs粒子生成過程」  
「Flavor mixing」  
「Weinberg-Salam理論における $Z^0$ ボソンの崩壊」
- 2000年度  
「K中間子を用いたCP対称性の破れ」（2名による共同研究）  
「高エネルギー電子-陽電子衝突におけるヒッグス粒子生成の検討」
- 2001年度  
「陽子・反陽子衝突におけるヒッグス粒子生成過程」  
「パートンモデルに基づく陽子の内部構造」
- 2002年度  
「 $K^0\bar{K}^0$ 混合におけるCP非保存」  
「Electron-Proton散乱とProtonの拡がり」
- 2003年度  
「深非弾性散乱と構造関数」
- 2004年度  
「ヒッグス粒子の生成・崩壊過程の理論的考察」（5名による共同研究）

(\*) 1998年度—2004年度卒研修了者 17名（博士前期課程進学者 12名）

# 超弦理論・M理論の構築

矢彦沢茂明

素粒子論とは物質を構成している基本粒子とその相互作用及び時空・宇宙の構造を研究する学問分野です。広い意味では、素粒子論は今までに知られた個々の自然法則や原理を、現在未解決な問題を手がかりにして、より簡潔な形で理解することを目指しています。ベータ崩壊に代表されるような弱い相互作用、ハドロンを構成しているクォークやグルーオンの強い相互作用、一般相対性理論によって記述される重力、そして電磁気力、これら四つの力とその力を感じる物質を量子論と矛盾なく統一的に記述する理論として、現在最も有望な理論が「超弦理論」です。この理論の素朴な見方は、まず振動している弦を考えて、その各振動モードを「素粒子」とみなし、次にそれが分裂したり結合したりする過程を考えることです。この見方からゲージ場や重力場の導出などの重要な性質が導けます。しかし、真空の構造や弦の多体問題等を調べるにはそのような素朴な振動論的な描像だけでは不十分であり、非振動論的な見方が必要になってきます。上で、「超弦理論」として「」を付けたのは、非振動論的な見方及び定式化においては素朴に弦を基本要素とする見方を離れる必要があるかも知れないからです。弦という見方をしないで定式化され、ある極限をとると従来の超弦理論が再現されるといった可能性もあります。さらに、時空というものの捉え方自体が変わっていくこともあるでしょう。

近年、双対性、Dプレイン、行列模型、時空の非可換性等をキーワードとして少しずつ「超弦理論」に進展が見られ、私も非振動論的な「超弦理論」の定式化に大いに興味をもって研究しています。また、時空に現れる宇宙初期の特異点やブラックホールの特異点の解消にも興味を持っています。なぜ「時空」は4次元なのか？ 宇宙項はなぜ小さいのか？ インフレーションはなぜ起こるのか？ ダークマターは何なのか？ なぜ電子の質量は約  $9 \times 10^{-31} \text{ kg}$  なのか？ なぜ物質は3世代なのか？ といった間に答えられる日が来るかも知れません。

研究においては非常に柔軟な発想や思考が必要です。素粒子論を契機として、物性論、宇宙論、ブラックホールの物理、数理物理、統計物理、情報理論 … 等にも興味を持っています。今までに、超弦理論以外にも、膜の理論、位相場の理論、超流体中の量子渦、宇宙紐のダイナミクス、Dインスタントン、時空の特異点、情報計量等々も研究してきましたが、それらはいずれも深いところで「超弦理論」と結びついています。

以下に、進展させている研究のうち特にインスタントンに注目して少々説明します。弦理論の別のテーマについては、D2の知崎君、M2の秦君と三宅君がそれぞれ博士号と修士号を目指して研究を行っています。

## (A) 行列模型と D インスタントン

ランダム行列の固有値の分布を調べることによって原子核のスペクトルなどの統計的分布を求めることが 1950 年代から行われていました。このような統計的観点とは違った幾何学的観点からランダム行列を捉え始めたのは 1970 年代からであり、その契機はトフーフトのゲージ理論

と弦理論の対応関係の指摘でした。このゲージ場そのものを扱うことは難しいですが、座標依存性等を無視し、単なる普通の行列とするならば扱いは簡単になります。このような普通の行列を用いた模型は 1970 年代後半から調べられており、「古い」行列模型と呼ばれています。現在では範疇が広がり、超弦理論や M 理論を構成する「新しい」行列模型の提案がいくつかなされていますが、これらの本質的進展のための一つのヒントが「古い」行列模型の研究です。この単純な「古い」行列模型は非臨界弦理論との関係について多くのことが厳密にわかつており、また、二重スケーリング極限をとることによって摂動展開の全ての次数についての情報を得ることができます。しかしながら、これで全ての情報がわかつているわけではなく、重要なことは非摂動論的な効果の扱いあります。そのポイントが D インスタントン効果です。福間と矢彦沢は行列模型における D インスタントン効果をボソン場表示及びフェルミオン表示を用いて構成し、具体的に計算を行いました。（ここまで詳しい話は、立教 SFR 講究録 No.1 を参照してください。）それ以後、非臨界弦理論における境界効果と行列模型における D インスタントン効果との対応がさらに詳しく調べられ、双対性についての理解が大変深まってきました。「古い」行列模型はこれからも進展のヒントをいくつも内蔵しています。

## (B) 情報の場の理論

統計的推論等で使われる情報幾何とは、確率分布のパラメータを座標とする多様体のリーマン幾何学であります。そして、情報幾何で重要な役割を果たすのがフィッシャー情報計量です。場の理論においては、古典的レベルでも、量子的レベルでも様々な確率分布関数が考えられます。統計物理学、物性物理学、素粒子物理学や弦理論などでよく登場する非線形シグマ模型のインスタントンの荷電密度を確率分布関数として採用すれば、インスタントンのモジュライ空間の計量が フィッシャー情報計量に対応します。従って、フィッシャー情報計量を計算することによって、インスタントンの統計的、あるいは確率的意味が幾何学的に見えてきます。逆に、インスタントンの性質からフィッシャー情報計量の対称性も見えてきます。実際、この場合のフィッシャー情報計量は反ド・ジッター計量となります。これは、超弦理論における AdS/CFT 対応と関連があり、大変深い意味合いを持っています。

## 弦理論に関する参考資料

超弦理論に関する以下の資料を参考にしてください。また、興味が湧いてきた方は気軽に立ち寄りください。

(1) 2002 年・2005 年に、立教大学太刀川記念会館で開催した「弦理論」研究会の講演内容は下記のホームページに公開されています。

<http://www.rikkyo.ne.jp/grp/itp/workshop/index.htm>

(2) 立教大学SFR自由プロジェクト研究「弦理論と重力理論の数学的構造解明に関する学際的研究」(代表:矢彦沢茂明)において、以下の8冊の講究録を作成しました。

- 講究録 No.1 「弦理論・共形場理論と保形性」
- 講究録 No.2 「可解格子模型入門 I」
- 講究録 No.3 「モーデル・ヴェイユ格子と弦理論、可積分系」
- 講究録 No.4 「弦理論の数学的構造」
- 講究録 No.5 「ゲージ理論・行列模型と非平衡統計物理学」
- 講究録 No.6 「可積分系をめぐる話題」
- 講究録 No.7 「多重ゼータ値および多重L値ノート」
- 講究録 No.8 「曲面の微分幾何学とソリトン方程式---可積分幾何入門---」

(3) 最近3年程度の発表論文は別のページに記載されています。ここでは、弦理論に関するお勧めの過去論文を紹介します。

Modular invariance of one-loop N-point amplitudes in heterotic string theory,  
S. Yahikozawa, Nuclear Physics B 291 (1987) 369

“Topological” formulation of effective vortex strings,  
M. Sato and S. Yahikozawa, Nuclear Physics B 436 (1995) 100

Nonperturbative effects in noncritical strings with soliton backgrounds,  
M. Fukuma and S. Yahikozawa, Physics Letters B 396 (1997) 97

Comments on D-instantons in  $c < 1$  strings,  
M. Fukuma and S. Yahikozawa, Physics Letters B 460 (1999) 71

# 高エネルギー天体物理学の理論的研究

柴崎徳明

## 1. マグネター

X線・ガンマ線を繰り返し爆発的に放射する天体である。中心星は1000兆ガウスという超強磁場をもつ中性子星である。X線・ガンマ線のエネルギー源は磁場のエネルギーそのものと考えられる。しかし、爆発的なエネルギー解放のメカニズムはまだ分っていない。中性子星の内部にある量子化された磁束管が表面層にストレスを与え、星震を起こすためと考え調べている。さらに、中性子星誕生の際、このような超強磁場が生じる原因についても研究を進める予定である。

## 2.マイクロクエーサー

大量のX線を放射するX線連星でブラックホールを含むものがある。相手の星から流れ出した物質がブラックホールに落ち込む際、その一部がジェット状に放出されることがある。これは活動銀河核の小型版でマイクロクエーサーとよばれている。電波、赤外線、X線の放射を手がかりに、宇宙ジェットの放出メカニズムに迫りたいと考えている。

## 3. パルサーグリッチ

パルサーグリッチとは、電波パルサーでパルス周期が突然変化する現象である。中性子星外殻の回転速度が突然変化するのである。その原因は中性子星の内部にあるとする説が有力である。超高密度の内部は超流動、超伝導の状態にあると考えられる。そこで現在、超流動渦糸や量子化された磁束管の振る舞いを調べている。グリッチを通して中性子星内部の性質と構造を明らかにしたいと考えている。

## 4. パルサー風とパルサーネビュラ

Be星と連星系を組んでいるパルサーがあり、この系からX線や $\gamma$ 線が観測されている。Be星風とパルサー風の衝突による衝撃波の形成、衝撃波での粒子加速、相対論的な電子・陽電子によるシンクロトロン放射およびコンプトン散乱というシナリオでX線・ $\gamma$ 線の放射を調べ、パルサー風の性質について重要な知見を得ることができた。現在はこの研究を発展させ、ガンマ線バーストや活動銀河核にみられる宇宙ジェットの性質について研究している。


# 原始銀河形成の理論的研究

須佐 元

われわれの住む宇宙には非常にバラエティに富んだ銀河や星がたくさんあります。またわれわれ自身も、宇宙で誕生した存在であることを考えると現在の宇宙は本当にさまざまな構造を持っていることがわかります。一方、現代の宇宙論は、観測的にも、理論的にも誕生直後の宇宙はきわめて一様でのっぺりしていることを明らかにしてきました。したがってわれわれの住む現代の宇宙はのっぺりした宇宙から何らかの物理過程によって進化し、現在のような賑やかな姿になったと考えられます。私たちの研究室ではこのプロセスについて研究し、数値シミュレーションの手法を用いて、コンピュータの中に、一様な宇宙からさまざまな銀河などの天体ができる様子を再現しようとしています。

## 1. 銀河の形成と宇宙の再電離（米谷・須佐）

現在の宇宙論では構造の形成は、第ゼロ近似では小さな密度の揺らぎが自分の重力によって成長することによって起きると考えられています。また出来上がる天体の大きさについては、比較的小さなものから順に大きなものへと階層的に起こったと考えられており、第一世代の銀河はわれわれの住む銀河系の 100 万分の 1 程度の重さであったと信じられています。一方、このような天体の中で大質量の星が誕生し、その若い星々からの紫外線が宇宙全体を電離してしまう、という現象が起こります。これは宇宙の再電離とよばれ、現在



の宇宙論でもっともホットな話題のひとつです。またこのような若い星による宇宙の電離は、当然自分の親銀河や、近傍にある銀河にも多大な影響を与えます。特に第一世代の銀河は質量が小さいために自分の重力が弱く、再電離によって加熱されたガスを銀河のポテンシャル内にとどめておくことができません。したがって銀河からガスが失われ、「蒸発」してしまうことが知られています。われわれはこのような銀河形成にまつわるさまざまな現象を数値シミュレーションの手法によって定量的に詳しく調べています。上の図はその計算の一例で、形成中の銀河のガスの分布を表しています。進化とともに小さな構造が発達するが、宇宙の電離とともにガスが失われていることがわかります。

## 2. 宇宙最初の星の形成（牧・須佐）

前述のように宇宙で最初にできる第一世代銀河の中では宇宙で最初の星が誕生します。これらの星は宇宙の歴史の中で非常に重要な役割に担っています。まずこれらの星は紫外線を放射することによって宇宙を再電離すると考えられています。第二にこれらの星は宇宙で始めてCやOなどの比較的重い元素を星の中の核融合反応で作ったと考えられています。われわれ人間の体は水や有機物でできていますから、その意味で宇宙の中で星がはじめて生まれた、というイベントは生命誕生に欠くべからざるものであったことがわかります。またこれらの重い元素は銀河や星を作るガスの熱的性質を大きく変えることが知られていますので、その後の星や銀河の形成の進み方にも多大な影響を及ぼす現象である、という見方もできます。したがって、これらの星がいつ、どの程度の量、またどのくらいの質量で生まれてくるかを正しく理論的に見積もることは現代宇宙物理学の中心的課題のひとつである、といつても過言ではありません。われわれはこの問題に対し、解析的、数値的な方法により迫っています。

## 3. 巨大N体自己重力系の数値シミュレーション（佐藤大・須佐）

実際の星や銀河の誕生の過程は複雑な化学反応や原子核反応、および放射の物理抜きには語ることはできません。しかしながら宇宙を構成する物質のうち普通の物質はおよそ7分の1程度でしかも、残りはダークマターと呼ばれる奇妙な物質である、と考えられています。このダークマターは電磁相互作用をしないために、光ではまったく見ることができず、重力源としてのみ働きます。そして普通の物質でできた星やガスはダークマターの作る重力ポテンシャルの中に沈んで銀河を形づくると考えられています。したがって、銀河の形成自体は非常に複雑な現象ですが、その銀河をホストする「ダークマターハロー」の形成は基本的に重力のみで記述される現象と言うことができます。われわれは、ダークマターハローの形成にまつわる諸問題（サブストラクチャ問題、NFW プロファイルなど）を取り組むために特別推進研究「FIRSTプロジェクト」に参画し、大規模な自己重力系の数値シミュレーションを行おうとしています。

## その他の情報

### 計算機設備 :

理論物理学研究室には 24 ノードの Pentium4 が Gigabit でつながった PC クラスタがあり、宇宙物理学の計算に用いられています。PC クラスタとは複数の普通のコンピュータが高速のネットワークで連結されたもので、おののおのの PC を協調動作させながらひとつの計算を行うことができます。その他にも 4 ノードの PC クラスタや、単体の PC があり、数値計算に用いられています。下の図は理論研にある 24 ノードの PC クラスタです。



### FIRST プロジェクト ( <http://www.ccs.tsukuba.ac.jp/ccs/projects/index-j.html> ) :

須佐は筑波大学で推進中の特別推進研究「融合型並列計算機による宇宙第一世代天体の起源の解明」に中心メンバーとして参加しています。FIRST プロジェクトは 256 ノード (512 プロセッサ) の PC クラスタのすべてのノードに小型の GRAPE (重力多体問題専用のボード) を装着し、超高精度計算によって第一世代天体、初代星の問題に迫ろうとするものです。実機は 2006 年度中の完成を目指しています。一部の大学院生もこの計画に参画し、研究を行っています。

### 須佐居室、HP アドレス :

居室は 4326

HP は <http://www.rikkyo.ac.jp/~susana>

### 卒業研究 :

卒業研究は人数によりますが、毎年2テーマを選んで研究を行います。テーマは教員側からも提示しますが、それにとらわれず、基本的に4年生の希望に沿って決めていきます。以下に過去3年の卒研テーマを列挙しておきます。

「膨張宇宙のパラメータ決定」2002年度

「第一世代天体形成の条件」2002年度

「銀河形成の条件」2003年度

「銀河中心の巨大ブラックホール形成」2003年度

「QSO吸収線系による宇宙再電離過程の解析」2004年度

「重力多体系のTree法による数値計算」2004年度

# 活動銀河中心核および超巨大ブラックホールの形成・進化論


大須賀 健

## 1. 超巨大ブラックホールの成長・進化過程の理論的研究

銀河の中心部には太陽の100万倍から1億倍もの質量を持つ“超巨大ブラックホール”が存在することが分かってきました。しかし、この超巨大ブラックホールがいつ、どのように生まれたのか、これは現在の宇宙物理学において最大の謎の一つとされています。このブラックホールの形成・成長過程を解明するのがこの研究の目的です。

ブラックホールはその強力な重力で周囲の物質を吸い込みながら成長する(質量が増える)と考えられていますが、その際、ブラックホールの周囲には降着円盤と呼ばれるガス円盤が形成され、大量の光エネルギーが放出されると同時に宇宙ジェットと呼ばれる物質の高速流出が起こると考えられています。したがって、ブラックホールの成長過程を知るために、ブラックホール周囲のガス降着円盤や宇宙ジェットに纏わる複雑な物理現象を調べなければなりません。

本研究ではコンピュータを用いた数値シミュレーションを用いてブラックホールの成長過程を調べています。計算には立教大学のPCクラスタ(24基のペンティアム4搭載)や他の研究機関の大型計算機を使用します。図1は数値シミュレーションの一例で、ブラックホールに物質が流れ込みつつ、宇宙ジェットが発生している様子を再現することに成功しました。



## 2. 成長末期のブラックホール降着円盤の理論的研究

ブラックホールは成長し続けることはなく、ある程度大きく（重く）なるとその成長が止まると考えられています。ブラックホールの成長停止はブラックホールの成長シナリオの最終章となっています。しかし、ブラックホールの成長過程と同じく、ブラックホールの成長を止めるメカニズムも未だ解明されていません。現在成長が止まっている超巨大ブラックホールを調べることでこの謎に迫ろうというのがこの研究の目的です。

現在成長が止まっている、もしくは成長率が非常に低くなっている超巨大ブラックホールの最も身近な例は、銀河系（我々の銀河）の中心にある超巨大ブラックホールです。銀河系の豊富な観測データとブラックホール周りの降着円盤の理論モデルを比較し、成長率の極めて低いブラックホールとその周囲の降着円盤の構造を調べます。

現在、このような成長率の極めて小さな降着円盤の理論モデルとして最有力と考えられているのが磁気降着円盤モデルと呼ばれるモデルです。このモデルでは重力に加えて電磁気的な力が重要とされています。本研究では磁気降着円盤モデルの予言する輻射スペクトル（波長ごとの光の強度分布）をコンピュータによる数値シミュレーションで求め、実際に望遠鏡で得られている銀河系中心の観測データとの比較を行っています。





図2：  
磁気降着円盤モデル。国立天文台のス  
ーパーコンピュータによる数値シミ  
ュレーション【(C)Y.KATO】

図3：

磁気降着円盤モデル（実線）と銀河  
系中心の観測データ（黒丸、矢印、  
蝶印）の比較。



### 3. 活動銀河中心核の形成・進化論

銀河中心に存在する超巨大ブラックホールは、その成長過程において大量の光エネルギーを放射します。このときの銀河中心部は母銀河と同じかそれ以上の明るさで輝きます。このような極めて明るい銀河中心を“活動銀河中心核”と呼んでいます。活動銀河中心核は、その膨大なエネルギー放出を通じて星や銀河の形成率に大きな影響を与えてきたと考えられるため、宇宙の進化を知る上で重要な研究テーマとされています。

活動銀河中心核の形成・進化過程は超巨大ブラックホールの成長問題と密接に関係しており、上述の1および2の研究ではこのブラックホール自体の進化過程をターゲットとしていましたが、この研究では母銀河も含めた活動銀河中心核の全体構造の形成・進化過程を調べています。

活動銀河中心核が発する光が銀河内の物質に与える影響を、数値計算を用いてより正確に調べることで、新たな進化シナリオを得ることに成功しました。図4はその描像を図示したものです。今後はより研究を発展させるため、スーパーコンピュータを用いた計算を計画しています。




図4：銀河および銀河中心核の宇宙論的進化の概略図。

# 原子核・放射線物理学研究室

|      |        |  |
|------|--------|--|
| スタッフ | 教授     | 家城和夫、小泉哲夫  |
|      | 助教授    | 平山孝人、栗田和好、村田次郎   |
|      | PD     | 福地知則   |
|      | 客員教員   | 本林透（理化学研究所）  |
|      | 実験技術員  | 村上浩之、須賀一治  |
| 学生   | 博士後期課程 | 菅野祥子、竹下英里、梅野泰宏   |
|      | 博士前期課程 | 井上泰吉、増田鉄也、瀬戸根正基、須合亮平、茅原雄太<br>藤田慎也、伊藤裕章、川村広和、加藤春明、窪寺隼人、町田智大 |

## 【研究室の概要】

当研究室では、原子核から原子、クラスター、結晶にいたるミクロな世界の物理を実験的に研究しています。放射線は原子核・原子の情報をになって放出されるため、その測定は有力な実験手段ですし、放射線そのものの研究も重要となります。大型の実験装置として、Cockcroft-Walton型加速器、重イオン衝突実験装置、微小反応断面積測定装置、ECR型多価イオン源などを備え、またGe(HP)  $\gamma$  線分析器など高性能な測定器も活用しています。

研究領域は、原子物理、原子核物理、放射線物理、放射線計測、表面物理などにまたがっており、各グループは独自の研究テーマをもちつつ協力しています。特に、放射線測定器、計測法、データ処理など共通性の高い課題については共同開発も行っています。また、毎週行っているコロキウムでは、全メンバー参加のもとで活発に討議をしています。これらの研究の遂行にあたっては、物理学科実験技術員の村上が電子回路の設計・製作で、須賀はCockcroft-Walton型加速器の維持管理で貢献をしています。

具体的な研究テーマは以下に詳しく述べますが、扱う現象のエネルギーはmeVから100GeVまでと大きく広がっていますし、 $\alpha$ 線、 $\beta$ 線、 $\gamma$ 線、中性子、イオンなど、あらゆる放射線を様々な測定器で測定します。また、高速なデータ処理の研究も行われ、それらを組み合わせた大がかりな実験も行われます。実験研究は、高エネルギー加速器研究機構、岡崎分子科学研究所、理化学研究所、東大CNS、放射線医学総合研究所などの学外の研究施設も利用して行い、近年では海外の研究所での研究もさかんになってきました。国内・外の研究者との共同実験も活発です。

研究室は、これらの研究活動への若い人たちの参加を期待しています。

# 不安定原子核の核反応


家城 和夫

物質の世界は分子ー原子ー原子核ー核子ークオーケークという階層性をもっており、それぞれの階層に多様性があります。原子核が陽子と中性子の多体系として認識されたのは 1932 年のことですが、現在では 6000~7000 種類の原子核があるとされています。しかし、そのうち安定な原子核は 250 種類ほどしかなく、大部分は  $\beta$  崩壊や  $\alpha$  崩壊ですぐに壊れてしまう不安定な原子核です。10 年ほど前に加速器を用いて人工的に作り出した不安定原子核をビーム状にし、壊れるまでの短い時間に他の標的に照射して反応を起こさせその性質を調べるという手法が確立しました。この方法でこれまでに詳しくはわかつていなかった多くの不安定核を実験的に詳しく調べることが可能となり、原子核物理の一つのフロンティアとなっています。我々は不安定原子核ビームを用いたいくつかの実験研究を進めています。


## 中性子過剰核の構造

安定な軽い原子核では陽子数と中性子数はほぼ同じです。不安定核のなかには  $^{11}\text{Li}$  のように中性子数(8)が陽子数(3)の倍以上ある原子核があります。このような原子核では中性子が非常に弱く結合しているため中性子だけが核の外側に大きく拡がったハロー構造をもつことが知られており、通常の原子核にはない運動状態をもつことが期待されます。それを調べるには原子番号の大きな他の原子核(鉛など)との衝突によりクーロン場で励起して分解させ、中性子(2 個)と残りの核( $^9\text{Li}$ )のエネルギーと方向を測定します。そこから励起状態や  $^{11}\text{Li}$  の構造についての情報が得られます。(これをクーロン分解反応法と呼びます。) 中性子を効率よく測定できる大面積の中性子検出器 (<http://www.nscl.msu.edu/tech/devices/neutronwalls/index.html>) をミシガン州立大(米国) やエトベシュ大(ハンガリー)らのグループと協力してミシガン州立大に建設し、これまでハロー核とされる  $^{11}\text{Li}$ ,  $^{6}\text{He}$ ,  $^{8}\text{He}$  などについて研究を行なって中性子 2 個が緩く束縛されている系の振動モードや崩壊様式についての情報を得ました。

2005 年度にはミシガン州立大で更に高いエネルギーの中性子の検出のために建設された大型中性子検出器 MoNA(<http://www.nscl.msu.edu/tech/devices/mona/index.html>) (写真) を用いて M2 の須合君と  $^8\text{Li}$  のクーロン分解反応の実験を行い、入射エネルギーについての依存性を詳しく調べる予定です。



原子核にも原子と同じように殻構造があります。つまり、希ガス原子が安定で不活性であるのと同じように、ある陽子数や中性子数の核ではまわりの核よりも安定性が高くなります。ところが、中性子数が 40 程度の中性子過剰核では安定核でみられる殻構造が変化していることが予想されています。しかし、このような重い中性子過剰核では反応後の粒子を精度よく識別することが難しく、粒子のエネルギー分解能を向上させる必要がありました。そのために連携大学院の青井助教授やD 4 の竹下さんらを中心に理化学研究所において TOF スペクトロメータという装置(写真)が開発され、飛行時間と Si 半導体検出器によって測定するエネルギーとを組み合わせることによって大きな立体角で高い質量分解能を得ることができるようになりました。2004 年度には  $^{64}\text{Cr}$  などの不安定核について陽子非弾性散乱の実験を行ない励起状態からの  $\gamma$  線を系統的に測定しました。その結果は竹下さんの博士論文としてまとめられる予定です。



## ハロー核のアイソバリックアナログ状態

$^6\text{He}$  は中性子ハロー核の一つであり、 $^4\text{He}$  の周りに 2 つのハロー中性子があると考えられています。この核は  $^4\text{He}$  と中性子 1 つ、あるいは中性子同士では安定な結合状態ができないのに 3 体となる  $^4\text{He}$  と 2 つの中性子では結合するという面白い性質をもっています。そこで、ハローの中性子の一つを玉突きのように陽子によってたたきだして置きかえるとどうなるか、という実験を 2003 年度に千葉市の放射線医学総合研究所で行ないました。このような状態をアイソバリックアナログ状態といいます。統計精度が悪いためにまだ確定的な結果は得られていませんが、アイソバリックアナログ状態がある程度できていることがわかり、山口君の修士論文(2004 年度)にまとめました。

## 元素合成過程

不安定核はそのほとんどが 1 秒以下で壊れてしまいますが、宇宙の初期や超新星爆発の際に不安定核は中性子や陽子と反応を起こします。元素合成過程、即ち、現在ある安定な原子核がビッグバン以降にどのようにしてできてきたのかを理解するためにはこのような不安定核を含む核反応の情報が不可欠です。不安定核のクーロン分解反応を利用すると、逆反応を利用してこのような核の反応断面積を求めることができ、いくつかの測定が行われてきました。特に、中性子を吸収して元素合成の反応が起こる過程についてはこれまで実験データがほとんどありませんでしたが、ミシガン州立大学でこれまで  $^8\text{Li}$  や  $^{14}\text{C}$  などの  $(n,\gamma)$  反応について測定を行ない断面積を求めました。

## 測定器・データ収集システムの開発

上にも述べたように、不安定核ビームの実験は安定核に比べて強度、純度等の点で不利であり、放出される中性子などのエネルギーと方向を精度よく、かつ効率よく測定する必要があります。ミシガン州立大学や放射線医学総合研究所での実験のために位置検出ができ中性子/ $\gamma$  線の識別が可能な大型の中性子検出器を作っていましたが、立教大学でも卒業研究としてそれらの基礎データの測定やシンチレーションファイバーを用いた新しいタイプの中性子検出器の開発を続けています。


不安定核の励起状態からの  $\gamma$  線の測定では不安定核が光速の  $1/3$  程度で運動しながら  $\gamma$  線を放出するのでドップラー効果を補正することが必要であり、そのために  $\gamma$  線の検出位置を精度よく決めることが実験データの質を大きく左右します。2005 年度から加わる PD の福地さんはこれまで G e 半導体の  $\gamma$  線検出器について入射位置を精密に決める研究を行ってきており、位置検出の技術をさらに発展させることを期待しています。

このような検出器からは多数の信号を高速に処理して収集し、オンラインで実時間処理のモ

ニターをすることが必要であり、これをネットワークで分散処理できるようなシステムの開発なども卒業研究を通じて行なってきました。

### コッククロフト加速器での実験

立教大学は私立大学としては珍しく学内に加速器施設（コッククロフト加速器）をもっています。原子核物理の研究用としてはエネルギーが低いのですが、学外の加速器とは違い自由に利用できるので、実験技術を磨く上では大きな利点をもっています。これまで卒業研究として固体金属中に高密度で吸収された重陽子を標的にした低エネルギー原子核反応の実験を行い、不安定核<sup>5</sup>H e の測定や、金属内での重陽子密度分布の測定や異常な荷電粒子放出現象の測定などを行ってきました。



# 究極の物質を求めて

## 栗田和好

### 1. 究極のQCDマシンRHICでの物理（井上）

ビッグバン直後の高エネルギー密度状態ではクォークとグルオンはハドロンの閉じ込めから放たれて自由に飛び交っているような状態(QGP)であったという。この新しい究極の物質状態を実験室で作ろうという試みが米国ニューヨーク州にあるブルックヘブン国立研究所のRHIC（リック）プロジェクトである。我々はPHENIX実験に参加してQGP生成の可否と陽子スピニ構造の解明に力を注いでいる。その目的はハドロンとその間に働く強い相互作用の基礎理論である量子色力学（QCD）を通して宇宙の成り立ちを理解することである。大学院生には米国で生の英語と異文化に接しその内で科学をする態度を学ぶよいチャンスを提供できるものと信じる。




図1：核子あたり 100GeV の金原子核の正面衝突  
から生成されるおびただしい数の粒子群イメージ

### 2. 安定な原子核からかけ離れた中性子数を持つ不安定原子核の特性を探るRIBFでの物理 (菅野、梅野、町田) 国内プロジェクト

QGPが冷えていくとクォークとグルオンは多数のハドロンと呼ばれる強い相互作用をする粒子に崩壊していく。このハドロンのうち3つのクォークとそれらをつなぎとめるグルオンでできている粒子群はバリオンと呼ばれる。さらに、このバリオンの主要なメンバーである

陽子と中性子が結合してさまざまな元素を形成し現在の宇宙が成り立っていると考えられている。しかし、現在の宇宙に分布する元素の存在比がどのようにして作り出されてきたのかは完全に理解されてはいない。この元素合成のプロセスをより深く理解するのには様々な原子核同士の反応断面積を正確に測定する必要がある。我々は連携大学院を結んでいる理化学研究所の本林グループとともに同研究所の不安定核ビームを用いた反応実験を行っている。理化学研究所は世界でも有数の不安定核ビームを用いた実験が可能な研究所である。これらの実験は世界をリードしておりその実験から数々の博士も誕生している。なお、理化学研究所の地理的な好条件から学部4年生の実験参加も可能である。




図2：原子核反応を用いて安定原子核からかけ離れた中性子数を持つ不安定原子核ビームを作るイメージ。

### 3. 不安定核の大きさを測る SCRIT 実験（増田）

原子核の大きさを知るには理論的な不確定性のない電子散乱を用いるのが常套手段であるが不安定核については固定標的を作ることができないために適用されたことは無い。そこで考えだされたのが電子蓄積リング中にイオンをトラップして浮遊固定ターゲットとして電子散乱を行うという手法 (**S**elf **C**onfining **R**adioactive **I**on **T**arget) である。そのプロトタイプはすでに製作され京都大学化学研究所の電子蓄積リング KSR に設置されている。2004年9月のテストですでにイオンがトラップされていることが確認され、現在は将来の電子散乱実験に必要な検出器の開発に重心が移っているところである。

理化学研究所の共同研究者たちは SCRIT と散乱電子の検出器を担当しているが、我々は電子の反対側にはじき出される非常に運動エネルギーの低い (50keV ~ 1MeV) 反跳核検出器の開発を担当している。世界で初めて不安定核の電子散乱を測定する大きなチャンスであるが技術的な問題も山積している。若い皆さんのアイディアとパワーをぶつけるには絶好のテーマ

であろう。

#### 4. その他

現在日本の原子核分野では理化学研究所の RIBF 計画と KEK + 原研の統合計画である JPARK の二つの大きな加速器（一台数百億円もする）が建設中である。 JFARK での実験を見据えた準備ももうそろそろ始めようと考えている。 その一つの可能性が偏極ガスジェットターゲットである。




図3：KSRのテスト実験用セットアップ。図中の反跳核検出器は現在開発中。

教育面においては前期に物理計測論と原子核・放射線物理学講究1、後期に力学1と力学ゼミナールを担当しており物理実験の根本となる物理的理解と実験にすぐに役立つ知識、測定器をブラックボックスではなく動作原理を理解して使えるようになることを目標に講義をしている。3年実験、特別実験では現在行っている実験研究に使用する検出器の開発を主たるテーマとしている。これらの開発は上述した世界第一線の実験に直接応用できるものを目指す。また、検出器性能の理解のためにコンピューターシュミレーションも行う。

## 大学生、大学院生へのメッセージ

物理学は自然の普遍的な真実を理解する学問であるためその進歩は実験を行いその結果とあわない理論を淘汰していくことによって正しい理論にたどり着くという過程を積み重ねていくことによってなされる。よって、実験物理学者には実験の物理的な意義をよく理解することとそのような議論に足るだけの信頼できるデータを提供していける実験技術と伝達能力が要求される。我々の研究室の基本的考えは学部時代には専門分野に移る前に物理の基礎をしっかりと学ぶこと。大学院の前期課程では実験の原理の理解とその技術力を磨くこと。博士課程後期課程では実際に実験を行いデータから普遍的な真実を引き出しそれを学術雑誌に投稿して正確に世界に伝えることを目標とする。

伝達の部分では全世界の科学者とのコミュニケーションが必須であり世界の共通言語としての役割を果たしている英語の習得は特に大切である。語学の習得は若いうちほど効率がよいので早い時期から英語力につける努力をすることを勧める。

# ベータ崩壊による標準模型の精密検証、近距離重力の実験研究

## 村田次郎

原子核崩壊を利用した低エネルギーでの超精密実験による素粒子の基本相互作用の研究を行っています。加速器で作り出した不安定な原子核や中性子のベータ崩壊の精密観測を通して、右巻きゲージボゾンや時間反転対称性の破れなどの素粒子標準理論を超える現象の発見を目指しています。また、ニュートンの万有引力の法則をミリメートル以下のスケールで精密検証する事で、我々の4次元時空を超える、高次元の世界の存在を検証しようという加速器を用いない実験研究も進めています。

### 1. 弱い相互作用の精密観測実験 (M1 川村広和, 卒研生 成田圭吾)

素粒子標準理論の確立から20年以上の年月が経過しました。その後の大統一理論、超対称性理論や超弦理論など素粒子論の発展の一方で、実験は超巨大加速器を建設しその猛烈な攻撃にも関わらず今だ標準理論から先の物理を発見出来ずにいます。本研究室では比較的小規模実験を行う事で超標準理論物理の発見を目指しています。現在建設が進められているヨーロッパのLHCに代表される超高エネルギー衝突型加速器による巨大実験は正攻法だと考えると、我々のアプローチはゲリラ戦法です。高エネルギー実験はエネルギーをより大きく与える事で「シグナル」を増幅する方法だと言えますが、シグナルを発見出来るか否かはバックグラウンド現象との区別が出来るかどうかだけにかかっています。そこで巨大加速器を用いずとも、わずかなシグナルを非常に精密な測定をする事でバックグラウンドから抽出しようと、中性子や原子核の崩壊の超精密観測を目指しています。

$$\vec{J} \cdot (\vec{P}_\beta \times \vec{P}_\nu) = - \vec{J}' \cdot (\vec{P}'_\beta \times \vec{P}'_\nu)$$



自然界に存在する原子核はその多くが安定ですが、加速器などで人工的に作り出した原子核はより安定な原子核に壊変します。その崩壊様式のうち、ベータ崩壊は標準理論の弱い相互作用で非常に精密に記述され、構造をもたない素粒子である電子を放出する為、精密な弱い相互作用の研究を行うのに適しています。例えば、標準理論では時間の向きを反転させても物理法則は変わらない、「時間反転対称性」がほぼ成立していますが、原子

核のベータ崩壊を利用するとこの対称性を検証する事が出来ます。スピン偏極した原子核の崩壊を考えましょう。ベータ崩壊では電子とニュートリノ、及び壊変後の娘核が生成されます。上図に示す通り、偏極ベクトルと運動量ベクトルの外積と内積で組まれるある量は、時間反転を行うと符号を逆転させる事がわかります。この量は実験で測定可能な量である為、例えば崩壊確率がこの量に依存するかどうかを調べる事で、時間反転対称性を検証する事が出来ます。

ここで考えたスピン偏極した原子核は、崩壊生成物を観測して上の量を調べるには、真空中にほぼ静止している必要があります。不安定原子核は通常、加速器によって標的中に生成されるか、理研の加速器施設で行われている様に、入射核破碎反応で高エネルギーのビームとして得られます。我々は理化学研究所、東工大と共同して不安定核ビームを気体中に停止させて、真空中に引き出す右図の装置を開発しています。真空中に引き出された原子線はシュテルン・ゲルラッハの実験の原理でスピン偏極されます。

さて、偏極していない不安定原子核の生成はより簡単で、偏極装置を外す事で得られます。そこで、時間反転対称性の検証

実験の前段階として、偏極していない不安定原子核のベータ崩壊に於ける、ベータ線とニュートリノの放出角度分布を精密に測定する実験準備を行っています。時間反転対称性の破れの探索実験に比べると系統誤差の取り扱いが難しい面がありますが、このベータ・ニュートリノ相関は標準模型の検証に強い感度を持っており、とりわけ、大統一理論の予言する右巻きのゲージボゾンの存在などの探索を行うことが出来ます。下図は、ベータ線の3次元飛跡検出器である、ドリフトチェンバーです。卒研究生が読み出し回路や飛跡再構成のプログラム開発を行いました。



## 2. 近距離重力の実験的検証、我々の4次元を超える余剰次元の探索（卒研生 荒木庸典、大森 健宏、櫻井慶人、山岡真一）

超対称性理論や超弦理論は世界が10次元や11次元であると予言しています。一方で素粒子の反応から熱力学まで、我々の知っている全ての現象は厳密に3次元空間を支持しています。しかし、盲点がありました。重力は他の3つの力に比べてあまりに弱く、素粒子のスケールはおろか実験室の大きさでもその基本である万有引力の法則は検証されていません。しかも重力だけは他の力と違って我々の4次元時空に束縛されずに自由に高次元時空全体を伝播する事が出来、その為に見かけの力の大きさが小さくなっているというシナリオがあり、万有引力の法則の検証により高次元の証拠が見つかる可能性が指摘されているのです。驚くべきことに、そのズレはミクロのスケールではなく、ミリメートル近辺で既に生じている可能性があります。


そこで、ミリメートルスケールでの重力の法則の検証をする、とてもわかりやすい実験を進めています。物体間の重力による、例えば振り子の変位を顕微鏡で観測する事で行います。簡単な顕微鏡を用いても、振り子のワイヤーの位置は特殊な統計画像処理を行う事でピコメータの精度で決めることが可能になる事が我々の研究でわかりました。この技術は特許を取得しています。我々は高精度の振り子の製作、統計的画像処理技術の開発により万有引力の法則を限界まで小さいスケールで検証する研究をゼロからスタートさせ、ノイズの中から重力によるシグナルを確認出来る所までこぎつけました。今後はより測定装置を工夫して、世界最高精度での重力の逆2乗則の検証を行っていく予定です。

また、ほぼ同じ装置を利用して、一般相対性理論における等価原理の検証を行うことが出来ます。重力の源として重力質量と呼ばれる量と、ニュートンの運動方程式に現れる慣性質量が同じものである、というのがその一つの帰結ですが、実に不思議なことです。等価原理のわずかな破れを要求する理論的なモデルも幾つか存在し、この問題に対しても装置を改造して取り組んでいきたいと考えています。


## 3. 新しい飛跡検出器の開発（M1 川村広和、卒研生 成田圭吾）

1. で紹介した不安定原子核の崩壊や、高エネルギー原子核衝突反応などで生成される粒子の方向などを測定する為には、複数の位置検出能力を持った検出器を並べて使用する必要があります。一方で、その様に放射線検出器を並べると実験装置全体が巨大なものとなってしまい、また、読み出しを要する電子回路のチャネル数も莫大なものになります。そ

こで、我々は目に見えないはずの放射線を「見える」様にして、光学的に捉える、全く新しい原理の放射線飛跡検出器の基礎技術開発をスタートさせました。放射線は蛍光物質に入射すると光をシンチレーション光として飛跡に沿って発生させます。一般にこの光は非常に弱く、光子の個数を数える事が出来るレベルのものですので、発生した光子は全て一つの光電子増倍管に集めて、光子の総数だけを時間の関数として計測する事が行われています。我々は、最新の半導体技術で実現しつつある、単光子のイメージング撮像可能な CCD デバイスを利用して、シンチレーション光による飛跡の光学的検出、再構成を目指しています。下図は、電子増倍型 CCD により撮影された、これまで不可能だった、シンチレーション光のシンチレータ中の画像です。



遮光なし。 $\beta$ 線源の場所がわかる。



遮光して撮影。シンチレーション光が見える。

以上の様なテーマを柱にして、活動しています。以下は、これまでの卒研のテーマです。

2003年度 「実験室スケールでの万有引力の法則の検証」

「位置検出型低エネルギーイオン検出器の開発」

2004年度 「ねじれ秤による近距離重力の検証」

「ドリフトチェンバーの3次元トラッキングシステムの構築」

「面白いことは何でもやる」をキーワードに、いつも新しいアイディアを探しています。何かを実際に実験でやってやろう！という気構えの学生が、我々の部屋に入ってきて一緒に頑張ってくれることを期待しています。

# 低エネルギー原子衝突実験

小泉哲夫

我々の世界は原子分子からできている。世の中で起こる様々な現象もミクロにみれば、原子や分子がお互いに接近してきて相互作用を起こすということの積み重ねである。この様な一つ一つの原子分子の”衝突”過程を素過程というが、原子衝突の研究とは素過程を通して世の中で起こっていることを理解しようとするものといえるだろう。原子衝突の研究で取り扱う衝突エネルギーは上は数MeVから、下は熱エネルギー領域までと非常に広い範囲にわたっている。対象となる粒子も、電子・光子・原子・分子・それらのイオンと多彩である。これらの粒子が衝突すると相手から電子を奪ってしまうとか、相手とくっついてしまうとか、実際に様々な現象が起こる。これは我々の世界の多様性を反映しているのだが、この多様性が原子衝突研究の魅力の一つである。さらに原子衝突の研究成果は広い分野に応用されている。宇宙空間での分子形成、核融合プラズマ、レーザー発振、化学反応、生体への放射線作用などの分野で原子衝突のデータが必要とされている。我々はその中でも低エネルギー領域（数十meV～数keV）でのイオンと原子・分子・クラスターとの衝突過程に興味を持って実験を行っている。低エネルギー原子衝突の実験は比較的小型の装置で行えるものが多い。そのため、学部4年や修士課程の学生でも、実験の全体を把握でき、中心になって実験を進めることができる。研究に興味のある方の参加を期待している。以下に我々の研究室で行われている研究を紹介する。

## 1) イオンと原子・分子の衝突過程

### 1-1) 多価イオンと原子分子の衝突

中性原子から電子をはぎ取るとイオンになる。電子を1個だけでなく複数個はぎ取った多価イオンはクーロンエネルギーとして大きな内部エネルギーを持っている。そのため多価イオンが原子・分子に衝突すると、たとえ衝突エネルギーが低くても標的原子・分子に大きな影響をあたえる。我々はハイテクリサーチセンタープロジェクトで導入した多価イオンビームラインを用いて、多価イオンと原子・分子の衝突過程の実験を行っている。高い内部エネルギーの影響が顕著に出ると思われる低エネルギー領域（数keV以下）での測定を中心とする。昨年度は多価イオンと分子が衝突したときに生成される分子多価イオンを研究するための測定装置の開発を行った。多価イオンと標的原子が衝突すると、電荷移行や標的の電離がおこり標的原子が電離されるだけでなく、入射イオンの価数も変化する。衝突過程を詳細に理解するために、入射イオンが荷電変換したイオンと標的原子が電離してきた生成イオンを同時計測できる計測システムを開発し予備測定を行った結果を図1に示す。




図1.  $\text{Ar}^{6+}$ イオン（入射エネルギー2.4keV）とAr原子の衝突で生成される多価イオンの同時計測スペクトル。

a) 入射6価イオンが2価イオンになった場合の生成イオン。b) 6価→3価の場合の生成イオン。単純な3電子移行だけでなく4価イオンも生成されている。

c) 6価→4価の場合の生成イオン。単純な2電子移行だけでなく3価イオンも生成されている。d) 6価→5価の場合の生成イオン。1電子移行だけでなく2価イオンも測定されている。

## 1-2) 二電子移行分光法

分子の2価イオンに関する情報をえるため二電子移行分光法を用いた測定を行っている。これは入射 $\text{H}^+$ イオンを標的分子に衝突させ、2電子移行で生成した $\text{H}^-$ イオンの運動エネルギーを精密に測定することによって2価分子イオンの電子状態を知ることができる。この方法を用いてNOや $\text{O}_2$ 分子の2価イオンの電子状態について知見を得た。さらに装置を改良し分子2価イオンが解離してできるイオンと $\text{H}^-$ イオンとの同時計測を計画している。これにより分子2価イオンの始状態を指定した解離過程の解明が可能となる。

## 2) クラスターイオンの衝突過程

孤立原子分子が無数に集まって液体・固体になることはよく知られている。では何個ぐらいの原子分子が集まると孤立状態と違つて液体・固体としての性質を示すようになるだろうか。これはたいへん面白い問題である。原子分子が数個から数百個結合してできる分子はクラスター分子と呼ばれ、孤立原子と液体・固体の中間の物質として注目を集めている。うまく条件を設定してやるとクラスター分子をたくさん作ることができる。このような条件では普通では結合しない希ガス原子でも結合しあじめ、He原子が10個も結合した分子などが見つかる。我々はクラスターイオンを大量に造るクラスターイオン源の開発を行い、クラスターイオンと原子

分子との衝突解離過程を通してクラスターの性質を実験的に研究している。クラスターイオンの衝突解離断面積から、クラスターの構造、クラスターの反応機構などの解明を目指している。

### **3) 低エネルギー領域のイオン分子反応**

最近、宇宙空間にかなり大きな分子が存在することが分かってきた。これらの分子の生成過程としてイオン分子反応が重要だと言われている。また宇宙初期の星の形成過程においてもイオン分子反応断面積の知識が必要とされている、星間雲の温度は 10~100K (1~10meV) といわれているから、このようなエネルギー領域でのイオン分子反応断面積の測定が重要になる。ところが低エネルギー領域の実験というのはそれほど簡単ではない。それは低エネルギービークには空間電荷効果という原理的制約があるため作るのが大変難しいためである。そのためいろいろな実験手法が工夫されている。移動管法はその一つで、冷却した気体の中にイオンを打ち込み気体分子との衝突で低エネルギーになったイオンを用いて実験を行う。我々は衝突エネルギー1eV 以下の領域（特に 10meV 程度の領域）でのイオン分子反応断面積をこの移動管法を用いて測定している。

### **4) 光子を用いた原子分子の電離過程**

ある程度のエネルギーを持ったイオンや光子が原子分子と衝突すると相手の電子をはぎ取る電離がおこる。単色の光を入射粒子とした場合には、原子の特定の準位にある電子を選択的に電離できるので、電離機構解明には好都合である。この様な測定は、シンクロトロン放射光を利用することによって可能となった。我々は、高エネルギー加速器研究機構フォトンファクトリーや姫路にある放射光施設 SPring-8 で、光子による原子分子の電離の研究を行っている。中性原子分子だけでなく、イオンを標的にできると等電子系列や等核系列の実験が系統的に行え、原子構造の解明に非常に有用である。しかしイオン標的の実験は難しく世界的にもあまり研究が進んでいなかった。我々のグループでは、イオンの光電離過程の測定に成功し、Xe の様な比較的重い原子イオンの内殻光電離断面積の絶対値測定を行った。最近は、ほとんど測定例がない金属原子のK殻光吸収による原子の多重電離過程の研究を行っている。

### **5) 放射線検出器の基礎的研究**

原子衝突実験や原子核実験を行うには高性能の検出器は必要不可欠なものである。我々の研究室ではその検出器の基礎的な性質の測定を行い、実験への応用や新しい検出器開発を目指している。そのひとつとして低エネルギー粒子検出によく使用される二次電子増倍管の検出効率測定をおこなった。この測定は断面積の絶対値測定には不可欠なものである。もうひとつは日立化成工業との共同研究で「放射線検出器及び検出器素子に関する基礎的研究」を行っている

(実験技術員村上氏の項参照)。ここでは主に固体シンチレータの評価や物性に関する基礎的研究を行い、新しいシンチレータの開発を推進している。

# 希ガス固体および希ガスクラスターにおける 電子的励起および崩壊過程の実験的研究

平山孝人\*

## 1 はじめに

私は以前からさまざまな様態の「希ガス」を対象とした研究を行ってきた。希ガス原子は「不活性ガス」と呼ばれることが示す通り、それ自身単体で安定に存在する单原子分子である。希ガス原子中の電子は許されている全ての軌道を占めていて、他の原子などと結合するための余っている手（結合手）を持たず、原子や固体といった全く違う様態でもその電子的性質はかなり似通っている事が知られている。そのため、原子数が最小の極限である孤立した原子、および最大の極限である固体、またその中間であるクラスターという3つの状態を「電子的励起過程」という一つのキーワードで統一的に理解することが可能であると考えている。

私の研究室では、希ガスクラスター・固体の二つの相について「電子的励起過程」がどのように起こるのか、また励起状態がどのように移り変わっていくのかを明らかにするための実験的研究を行っている。

## 2 希ガス原子

希ガス原子に電子や光などを衝突させることにより、電子的な状態を変化させることができる。例として、Neの場合の電子的励起状態の生成スペクトルを図1に示す。スペクトル(A)と(B)はNe原子を標的とした場合である。例えば2p軌道の電子を3s軌道に励起して2p<sup>5</sup>3s状態の原子を作るのに必要なエネルギーは、約16.8eVであることがこの結果から解る。ま




図1: Neを標的とした電子的励起状態の生成スペクトル。  
(A) Ne原子の光励起。(B) Ne原子の電子励起。(C) Ne固体の光励起。(D) 光励起によるNe固体表面からの励起原子脱離収率。(E) 光励起によるNe固体表面からの全脱離収率。(D)と(E)の結果のみ私の研究結果である。

\*hirayama@rikkyo.ac.jp, <http://www.rikkyo.ac.jp/~hirayama/>

た、ピークの高さがその励起状態の生成しやすさに対応する。光子で励起した場合(A)と電子で励起した場合(B)のスペクトルは良く似てはいるが、例えばスペクトル(B)で18.6–19.0 eVに現れる2p<sup>5</sup>3p状態のピークは(A)には観測されていない。これは量子力学的な角運動量保存則である「選択規則」により、2p<sup>5</sup>3p状態は光衝撃では生成できないためである。

希ガス原子を標的とした実験は古くからいろいろな手法を用いて行われ、また理論的にも数多くの研究例があるため、原子の電子的励起状態はかなり良く解ってきている。後述する希ガス固体と希ガスクラスターの研究を行うにあたっては、原子で得られている情報が役に立つことが多い。

### 3 希ガス固体

前述した通り、希ガス原子は結合手を持たないために通常の環境では他の原子と結合せず、結合エネルギーが非常に小さい。Ne, Ar, Kr, Xe固体の結合エネルギーはそれぞれ0.02eV, 0.08eV, 0.12eV, 0.17eVであり他の物質(例えば鉄:4.3 eV, 塩:7.9 eV)と比べて極端に小さいため、固体(氷)を作るためには極低温にする必要がある。固体を作るために必要な温度は、Neの場合では7K程度以下、Xeの場合は50K程度である。

Ne固体を標的とした場合の電子的励起状態の生成スペクトルを図1(C)に示す。原子を標的とした場合とはピークの位置・太さが大きく異なっていることがわかる。しかし、その違いを詳しく調べてみると、原子の場合に観測されているピークが全て少しずつ高エネルギー側にずれ、かつ太さが太くなっていると考えるとうまく説明ができることが知られている。希ガス原子は安定であり周囲の粒子と反応を起こさないため、原子の場合でも固体の場合でも(多少の違いはあるが)電子的励起に関してはほぼ同様の過程が起きていると考えて良く、このことは、さまざまな様態の希ガスを研究するうえでの利点の一つとなっている。

Ne固体中にNe原子の最外殻電子を一つ励起してできる1s<sup>2</sup>2s<sup>2</sup>2p<sup>5</sup>3s状態を生成した場合について考えてみる。この励起状態は約10<sup>-8</sup>秒程度の寿命を持ち、その後光を放出して基底状態(1s<sup>2</sup>2s<sup>2</sup>2p<sup>6</sup>)に落ちる。孤立した原子の場合にはその時間内に他の原子と出会う確率は非常に低いが、固体のようにすぐそば(固体Neの場合は隣の原子との距離は0.32nm)に原子が存在するような環境では、10<sup>-8</sup>秒という時間でも相互作用を起こすには十分な時間である。1s<sup>2</sup>2s<sup>2</sup>2p<sup>5</sup>3sという励起状態は、1s<sup>2</sup>2s<sup>2</sup>2p<sup>5</sup>という状態の正イオンの外側に電子が1個存在している状態であり、アルカリ金属であるNa原子(電子配置:1s<sup>2</sup>2s<sup>2</sup>2p<sup>6</sup>3s)と似た状態になる。また、電子を一つはぎ取った(電離した)場合(電子配置:1s<sup>2</sup>2s<sup>2</sup>2p<sup>5</sup>)は、ハロゲン元素であるF原子と同じ電子配置である。アルカリ金属元素もハロゲン元素も非常に反応性が高いことが知られている。すなわち、基底状態では「おとなしい」希ガス原子も、励起状態やイオンになった途端に非常に反応性が高くなり、周囲の原子と様々な反応を起こす。孤立した原子を標的として実験を行った場合は違い、固体を標的とした場合にはこのような励起原子と周囲との相互作用を効率的に観測することが可能となる。

図1のスペクトル(D)と(E)は、それぞれ固体Neを光で励起した時に脱離する励起原子と全原子の脱離強度の入射光エネルギー依存性である。固体中に生成した励起原子の量はスペクトル(C)のピークの高さで知ることができるが、「励起後の脱離」という現象を通してみると、たくさん励起させたからと言ってたくさん脱離するとは限らないことが解る。また、同じ「脱離」という現象を見ても、脱離する原子の種類によってその様子が全く違うことが(D)と(E)の比較から明らかである。これらの結果を解析することにより、固体を構成する原子が励起後に周囲の原子とどのような相互作用を起こすのかなど、原子レベルでの詳細な情報を得ることができる。

### 3.1 低エネルギー電子衝撃による希ガス固体からの脱離現象の観測（加藤春明）

低エネルギー(10 eV ~ 50 eV)電子衝撃による固体Neからの脱離励起原子の脱離収率・脱離エネルギー分布・脱離角度分布の試料温度依存性を測定している(試料温度範囲: 4.5 ~ 7 K)。固体表面の結晶構造が脱離角度分布に影響を及ぼすことが明らかになり、現在、より詳細な測定および解析を行っている。

### 3.2 低速多価イオンと希ガス固体の相互作用（須賀一治、藤田慎也）

2001年度にハイテクリサーチセンター整備事業により購入した電子サイクロトロン共鳴(ECR)型多価イオン源を使用して、多価イオンと希ガス固体相互作用に関する実験を行っている(図2)。多価イオンとは価数が2価以上のイオンのこと、それ自身の持つ内部(静電)エネルギー(=イオン化エネルギーの総和)が大きいため、多価イオンが固体表面に衝突した際には、固体を構成する原子の電子状態やそれらの幾何学的構造に大きな影響を及ぼす。現在、主に脱離粒子の観測を通して、非常に多い希ガス固体の表面および固体中で、多価イオンの持つ巨大な静電エネルギーがどのように消費されるのかを定量的に明らかにすることを目的とする実験を行っている。




図2: 希ガス固体-多価イオン衝突実験装置全体図。

Ar多価イオンを固体Ne表面に入射したときの絶対脱離収率の測定結果を図3に示す。入射イオンのエネルギーが1 keV程度でも脱離収率は数千(原子/入射イオン)という驚くべき結果が得られた。このような大きな脱離収率は吸着エネルギーが非常に小さい(20 meV/atom)固体Neを標的としたことで初めて観測された現象である。また、 $\text{Ar}^+$ 衝撃による脱離収率は、入射エネルギーに対して原点を通る直線(図中の実線)でよく表され、 $\text{Ar}^+$ による脱離は運動学的な効果(Kinetic Sputtering: KS)のみであることを示している。KSによる脱離はその運動エネルギーにのみ依存するために入射イオンの価数には依存しないので、 $\text{Ar}^{4+}$ および $\text{Ar}^{6+}$ と $\text{Ar}^+$ との脱離収率の差は内部エネルギーによる効果(Potential Sputtering: PS)に依るものと考えられる。

$\text{Ar}^{q+}$  ( $q = 2, 3, 4, 6$ ) 衝撃による PS 脱離収率とそれぞれの多価イオンの持つ内部エネルギーとの関係を図 4 に示す。この図から、内部エネルギー 1eVあたり約 4 個の原子が脱離し、また PS 脱離の散居エネルギーが約 20eV であることが分かった。この散居エネルギーは固体 Ne における励起子生成 (17.5eV) およびバンドギャップエネルギー (21.5 eV) にほぼ一致し、PS 脱離機構が固体内の励起状態生成およびイオン化に強く関係していることが明らかになった。




図 3:  $\text{Ar}^{q+}$  ( $q = 1, 4, 6$ ) 衝撃による固体 Ne からの脱離収率の入射イオンエネルギー依存性。実線は  $\text{Ar}^+$  に対するフィッティング直線。




図 4:  $\text{Ar}^{q+}$  ( $q = 2, 3, 4, 6$ ) 衝撃による固体 Ne からの脱離収率の内部エネルギー依存性。実線はフィッティング直線。

## 4 希ガスクラスター

クラスターとは原子が有限個集まったものである。実験的に生成可能なクラスターの大きさ（原子数）は、2～数百万個程度であるが、その大きさにより「物理」が変わってくる。原子数が 10 個程度以下では、「原子」としての性質を強く示すが、例えば 100 万個（直径が原子数約 100 個分）程度になるとそれはほぼ「固体」としての物性を示す。その中間の状態を観測すると、物質の性質が「原子」から「固体」へどう変化していくのかを知ることができる。

### 4.1 電子エネルギー損失分光法を用いた希ガスクラスターの電子的励起過程の研究（瀬戸根正基、窪寺隼人）

この研究では、断熱膨張法を用いて希ガスクラスタービームを作り、そこに低エネルギー電子を衝突させることにより励起状態原子を生成し、その生成エネルギーおよび生成確率のクラスターサイズ依存性を広い範囲のサイズ（原子数数十～数十万）で測定する計画である。特に、電子的励起過程という観点から、どれくらいの数の原子が集まつたときに「固体」としての性質を持つのか、という点に興味を持っている。また、クラスターはほぼ球形をしているので、固体と比べると表面を構成する原子数の割合が高い。そのため固体を標的とした場合には観測が難しい表

面第1層目のみで起こる励起（表面励起子）を感度良く測定することが可能である。

この研究のために製作した電子エネルギー損失分光装置を図5に示す。標的とする希ガスクラスターbeamは粒子密度が低いため、観測される信号も非常に弱いことが予想される。この困難を克服するために電子ビームとクラスターbeamを合流して衝突させる、合流ビーム法を採用した。現在Arクラスターを標的とした電子エネルギー損失分光実験を行っている。




図5：合流ビーム法を用いた希ガスクラスターの電子エネルギー損失分光装置。実線は電子ビームの軌道、破線はクラスターbeamの軌道を表わしている。

## 宇宙地球系物理学研究室

|      |       |                     |
|------|-------|---------------------|
| 教職員  | 教授    | 吉森正人、山本博聖、北本俊二      |
|      | 助教授   | 柳町朋樹、平原聖文           |
|      | 実験技術員 | 村上浩之、関口宏之、須賀一治      |
| 研究員  | PD    | 藤川暢子、野澤宏大、辻本匡弘      |
| 大学院生 | 前期課程  |                     |
|      | M2    | 佐藤順一、須藤敬輔、星野慎二、渡邊岳史 |
|      | M1    | 大久保洋輔、関口晶子          |


### 研究室概要

地球は広大な宇宙に浮かび、太陽の周りを巡る宇宙船に例えられる。この地球には、我が銀河系の内外を起源とする電波からガンマ線に及ぶ電磁波や宇宙線と呼ばれるエネルギーの高い粒子が、昼夜を問わず降り注いでいる。そして、太陽からは、電磁波の他に秒速数 100 km にも達する高速のプラズマ流（太陽風）が絶えず吹き付けている。また、時々太陽表面で起こる爆発現象（フレア）により、大量の紫外線やX線、粒子さらには磁気流体衝撃波が地球を襲い、様々な地球物理現象（磁気嵐やオーロラなど）が引き起こされ、人間活動にも影響を及ぼしている。

地球は厚い大気のベールに包まれており、また磁場を持っている為に、宇宙空間からやってくる宇宙線や太陽風、さらには太陽面爆発からの強い放射線の大部分が、地球表面にまで侵入できず、我々人類の生命圏が守られている。地球表面には、大気が主役を務め地球環境に大きな関わりを持つ「大気圏」があり、その外側には、地球の大気・磁場と太陽風とが様々な現象を繰り広げる「電離圏」「磁気圏」がある。さらに地球から離れると太陽の勢力圏である「惑星間空間」や「太陽圏」が広がっており、その外には恒星の世界である「星間空間」、さらには無数の銀河が散在する「銀河間空間」が広がる。

そこには、太陽に代表されるような普通の星とともに、ブラックホールや中性子星のような特殊な天体等が多種多様な現象を引き起こし、宇宙や銀河の進化に重要な役割を演じている。

宇宙地球系物理学研究室では、ロケットや人工衛星を利用し宇宙空間から、あるいは地上からの様々な観測により、地球上層の大気光、磁気圏プラズマ、太陽面爆発現象、太陽圏粒子・銀河宇宙線、及びブラックホールや



中性子星をはじめとする色々な天体の研究を進めており、各研究分野の発展に大きく寄与している。また、これらの観測に利用される装置の開発も同時になされている。本研究室の観測の多くは、宇宙科学研究所本部および関連国際協力プロジェクトに参加して行われており、国内外の共同研究として展開されている。

以下に本研究室で展開されている研究内容を分野別に紹介する。

### [宇宙物理学]

我々の住む宇宙は、多種多様な環境が混ざり合って存在しながら、開闢以来進化を続けていく。観測が進むにつれて、宇宙の進化と形態は解き明かされていく。しかし、一方で新たに数々の疑問が生み出される。最新の観測を進めながら、最新の疑問に答えるべき宇宙の研究を進めている。

コンパクト星とその周辺の物理学：宇宙に存在する中性子星や白色矮星は、通常の星のように物質の熱運動によって自己重力を支えるのではなく、電子や核子の縮退圧で自己の重力を支え形を保っている。ブラックホールは、自己重力を支えることができなくなった状態である。これら3種の天体をコンパクト星と呼ぶ。これら不思議な天体が実際にどのように存在しているのか。また、その周りでは、超強重力場、超高温、超高压、超強磁場等の極端な環境での実験室では到底実現できない物理現象が繰り広げられている。それら物理現象を解き明かし、そこからコンパクト星の性質を観測的に研究している。

星や星間空間の物理学：宇宙に広がる星と星の間の空間には、数百万度で $1\text{ cm}^3$ に原子1個程度という高温低密度空間から、冷たいガス雲である暗黒星雲に至るまで、いろいろな温度と、広範囲な真空度の環境が分布する。その中で星が形成されたり、衝撃波が伝わったり、実験室での物理学とは違った現象が繰り広げられている。そして生まれた星は光や物質の放出によって回りの空間に影響を及ぼす。これら星と星間空間を研究することで、星の進化、銀河の進化まで研究を進める。

銀河と銀河の間には、さらに低密度な空間がある。銀河が集まった銀河団と呼ばれる天体は宇宙で最も大きな重力で結びついた構造と考えられており、そこには高温ガスが充満してX線を放射している。これらの高温ガスを観測的に研究することで、現在宇宙を支配していると考えられている暗黒物質やさらには暗黒エネルギーについて、観測的に研究を進める。

### [太陽地球系物理学]

太陽・惑星間空間・地球大気圏を一つの環境系としてとらえ、21世紀の宇宙時代における新しい視点から見た太陽と地球の関わりとその重要性について研究を行っている。

太陽物理学：宇宙の中でごく平凡な恒星である太陽が、どのようにして誕生し、そしてどのよ

うに進化するか、太陽エネルギーはいかにしてつくられるのか、太陽面での活動現象とは何か、そして太陽の地球環境への影響についての研究を進めている。

惑星間空間物理学・宇宙線物理学：惑星間空間はプラズマと電磁場により支配されている。特に太陽コロナからは可視光や紫外線以外に太陽風プラズマと呼ばれる高速プラズマ流が太陽磁場と共に惑星間空間へと流出し、太陽系内の宇宙空間を支配している。ここは地上と比べれば限りなく真空に近く、それらが相互作用する相手も存在しないため、取り立てて物理の対象となるような領域ではないと思われるかも知れない。しかし、太陽活動に起因する乱れが伝わり成長することにより、極めて活動的な領域が生成される。また、太陽系外から流入する宇宙粒子線に、少なくない影響を及ぼす領域もある。

惑星磁気圏・電離圏物理学：一方、太陽風は地球磁場や地球大気と複雑に相互作用しており、その結果、ジオスペースと呼ばれる宇宙環境を形成している。これら惑星間空間物理学では、プラズマと電磁場の物理過程を基礎とし、地球近傍の宇宙空間における自然現象について研究している。

地球超高層物理学：太陽からの様々な影響を受け地球大気は変動している。更に近年は人間活動も大気にとては無視出来ない効果を及ぼしつつある。最も地表に近い対流圏、その上層に成層圏、中間圏、熱圏と温度構造を基に名称がつけられている。これらの大気構造や大気中で起こる物理・化学過程の研究が行われている。

# 太陽面爆発と高層地球大気の運動の研究

吉森 正人

## 1. 研究の目的

地球環境を決定している最も基本的なエネルギー源は太陽光であり、そのエネルギーfluxは地球軌道では  $1.96 \text{ cal/cm}^2 \text{ min}$  のほぼ一定値であり、太陽定数と呼ばれている。しかしながらこの太陽定数が、太陽表面における活動度によって 0.1 %のオーダーで変動し、太陽活動度と相関関係を示すことが衛星観測からわかつてき。太陽表面で発生するプロミネンスをはじめフレアそしてコロナ質量放出等さまざまな規模の活動現象を支配しているのは、黒点の磁気エネルギーであるが、そもそも太陽活動は、どのようなメカニズムでおこり、そしてそれがどのようにして太陽光のエネルギーfluxの変化を引き起こすのかを解明することは、太陽物理学の最も基本的な研究課題のひとつであり、地球環境への影響を考える原点でもある。

本研究の目的は、太陽活動の中で最も大規模なコロナの磁気プラズマの爆発現象(フレア)を、非熱的プロセスに重点を置き、コロナ中での高エネルギー plasma 粒子の生成過程を、人工衛星で観測された X 線、ガンマ線、粒子データの解析から明らかにしようとするものである。また太陽活動と関連して、地球大気に入射する銀河宇宙線および太陽高エネルギー粒子によって、成層圏および対流圏で生成される放射性元素 Be-7 および地球起源の放射性元素の降下量を地上で連続的に測定し、高層における複雑な大気運動の時間変動を解析する。高層大気の運動は、地球環境の変化にも影響を与えるが、これまで気象学では研究されていない部分も多くあり、放射性核種 Be-7 をトレーサーとして、太陽物理学、地球物理学そして環境科学の学際領域である地球環境の変動を太陽活動の観点から解明しようとするものである。

## 2. 研究成果

### (1) 太陽面爆発における高エネルギー現象

太陽フレアは、黒点磁場に蓄えられたエネルギーが、磁力線のつなぎかえにより短時間のうちに解放され、コロナのプラズマ粒子を数千万度の高温に加熱したり、 $100 \text{ MeV}$  以上の高エネルギー粒子をつくり出す爆発現象であり、地球環境にもさまざまな影響を及ぼすことが知られている。1991–2000 年に日本の太陽観測衛星「陽光」によって得られた多数の大型フレアから放射された X 線およびガンマ線ラインのデータを詳細に解析し、電子の制動放射ならびに陽子の原子核反応の過程を明らかにした。観測された  $100 \text{ keV}$  から  $100 \text{ MeV}$  における広帯域電磁放射スペクトルからコロナプラズマの加速メカニズム(プラズマ波動と粒子との統計加速)を推測し、また非熱的プラズマ粒子のエネルギー総量を求め、磁気エネルギーの 1–10%が粒子の加速に使われることを示した。

## (2) 放射性トレーサーBe-7 および Pb-210 を利用した高層大気運動の研究

地球大気中には銀河宇宙線や太陽高エネルギー粒子によって生成される宇宙起源の放射性核種 Be-7(半減期 53 日)や地球起源の Pb-210(半減期 22 年)などがエールゾルに付着し、成層圏から対流圏の中を運動している。地表に降下する Be-7 および Pb-210 をダストサンプラーにより収集し、これらが放射するガンマ線のスペクトル分析から、地表へ降下する Be-7 および Pb-210 の量を決定した。2002 年からの連続測定からこれら 2 つの降下量は、春と秋に増加を示す明らかな季節変動が存在することがわかった。この結果は、成層圏および対流圏における大気運動に起因すると推定されるが、特に日本上空では春と秋に偏西風によって移動性高気圧と温帶低気圧が対になって周期的に発生するが、これに伴って高層大気に大きな大気循環が発生し、Be-7 および Pb-210 の地表への降下量が増加するプロセスを提案した。

### 3. 今後の研究計画

太陽フレアの研究は、日本の「陽光」衛星が 2000 年に観測を終了したために、2001 年 NASA が打ち上げた新しい太陽衛星「RHESSI」によって得られた X 線およびガンマ線のスペクトルとイメージの精密データを解析して、さらに詳細なフレアにともなう高エネルギー粒子生成のメカニズムを追及する。「RHESSI」衛星ではフレア時に 10 MeV 以下のエネルギーで、いつ、どこでガンマ線が発生したかがわかるイメージデータが得られるので、粒子加速に関する新たな手がかりが得られるものと期待される。

また放射性核種を利用した高層大気運動の研究では、これまで太陽活動の影響がどの程度あるかが、理解されていない。この点を調べるためにさらに連続観測を継続すると同時にグローバルな観点から高層大気運動を調べるために、日本以外に高緯度地帯における Be-7 および Pb-210 の連続測定の計画をロシア科学アカデミー極域研究所の協力を得て進めている。予備的測定の結果から、極域では 1 月から 2 月初めにかけて Be-7 の降下量が急増するが、それが何に起因しているかを、今後解明していきたい。

# 超高層大気の研究

山本博聖、関口宏之、野澤宏大

わたしたちは地球に空気があることをあまり認識することなく毎日の生活を送っている。高い山に登ったときに空気が薄い、あるいは天気予報で「冷たい空気が南下してきます」と聞くときにその存在に気づく。大気は惑星などがその星の周りに持つ気体を呼ぶときの名称で、地球の場合は特に空気と呼んでいる。地球大気は窒素分子（N<sub>2</sub>）と酸素分子（O<sub>2</sub>）を主成分としていて、窒素4酸素1の割合は高度100kmまでほぼ一定である。これらの主成分と、雨を降らせる水蒸気（H<sub>2</sub>O）、温暖化と密接に関連している二酸化炭素（CO<sub>2</sub>）や太陽から来る有害な紫外線を防いでいるオゾン（O<sub>3</sub>）などを微量成分として地球の大気は構成されている。天気に直接関与している大気は地表から10kmほどまで、飛行機が飛行している高さもほぼ10kmである。さらにずっと上空のスペースシャトルが飛行する高さ（ほぼ300km上空）にもほんのわずかな（地表密度の1千億分の1程度）大気がある。地球半径6400kmに比べればほとんど地球表面に密着しているとも考えられ、この高さでの地球引力の大きさは地表面とほぼ変わりない。われわれが日常「宇宙」と判断する場所は距離としては地球に近いが、大気が極めて薄い、ほとんど真空と呼んでもよい場所である。この非常に薄い大気がわれわれを守っている。

地球大気の温度は地上から上空に行くに連れて少しづつ下がってゆき、10km高度（地表と比べて気圧は3分の1、密度は半分）では氷点下50度にも達している。ここから上昇に転じ50km高度付近（気圧2000分の1、密度1000分の1）で約0度に達したあと、再び高度の上昇とともに下がり、高度約90kmから100km領域（気圧100万分の1以下、密度50万分の1以下）では、最も低い温度（氷点下約80度）になる。さらに上空では太陽からの紫外線を吸収する効果で暖められ上昇する。温度構造をもとに、地上から10km付近までを対流圏（Troposphere）、50km付近までを成層圏（Stratosphere）、90km付近までを中間圏（Mesosphere）、その上空を熱圏（Thermosphere）と呼ぶ。

わたしたちの日常の生活は対流圏の中に限られているが、太陽から来る有害な紫外線の大部分を防ぐ役目を果たしているオゾンの多くは成層圏に存在していることは、超高層の大気がわたしたちに密接な関連を持っている一つの例である。また、これ以外にも、航空機の飛行高度の10km付近では、中緯度地域（日本やアメリカ、ヨーロッパ諸国などが位置している領域）においては、年間を通して西風が吹いている。このため日本からアメリカに向かう場合と帰国の場合とでは飛行機は同じルートを行き来するのではなく、西風を利用したり避けたりの工夫がされている。近年の飛行機では飛行ルートや現在位置を地図の上で示してくれているの

では是非ルートの違いを確認して欲しい。

高度10kmから100km付近を中層大気(Middle Atmosphere), さらに上層までを含めて超高層大気(Upper Atmosphere)と呼ぶ。成層圏オゾン(Stratospheric Ozone)の役割や、南極領域で発見されたオゾンホール(Ozone Hole)、そして地球温暖化など地球大気はこの数年できわめて身近な存在であることが認識されてきている。

わたしたちは主として夜間大気光観測結果から中間圏大気の物理化学過程の解明と、地上に到達する太陽紫外線強度の変動ならびに大気オゾンの変動について研究を進めている。現在取り組んでいる研究テーマの紹介を以下に述べる。

### 1.メソポーズ領域の大気温度の観測

メソポーズ領域(Mesopause Region)は高度90km付近を指し、大気温度が最も低温の領域である。ただし、最近最低温度領域は100km付近にあるとの研究結果も出され、メソポーズ領域の定義も変わることが考えられる状況にある。この領域でオゾンと水素原子の反応の結果うまれた水酸基(OH)がかすかな光(OH大気光と呼ぶ)を出している。太陽光はもちろん月明かりでさえもOH大気光よりはるかに明るい。このため月明かりの影響が少ない時期を選んで夜間に観測を行う。OH大気光は可視域から赤外領域にわたり発光しているが、わたしたちは近赤外線領域で光るOH(3-1)帯発光を観測対象としている。これまでに夏季に低温、冬季に高温を持つ1年変動が観測されていて、地球規模の大きな大気の運動の結果であるとして理解されている。短い時間スケールでも変動し、これの原因は対流圏あたりでの小さなスケールの擾乱が上層へ伝播した結果であると解釈されている。

定常の地上観測は池袋キャンパス13号館(東経139.7度、北緯35.7度)ならびにブラジルのサンマルチニョ観測所(西経53.8度、南緯29.4度)で行っている。ブラジルでの観測はブラジル宇宙科学研究所(INPE)との協力で進めている。

定常の地上観測にあわせて2004年1月には鹿児島内之浦ロケットセンターにおいて、ロケット搭載機器による大気観測とタイアップした地上観測を実施するなどの共同観測も行つてきている。

### 2.太陽紫外線強度の地上観測

太陽紫外線はA領域(波長315nmから400nm)、B領域(280nmから315nm)そしてC領域(190nmから280nm)と分類されている。成層圏オゾンによりUV-Cは完全に大気中で吸収され、地表には届かない。一方UV-Aはオゾン吸収はほとんど効かない。地表に到達し、かつ生物への影響が大きいUV-Bがオゾン全量変動と大きくかかわっている。

池袋とサンマルチーニョの両地点でUV-A、UV-Bそして295 nmから400 nmの分光測定を実施している。大気オゾン変動を意味する太陽紫外線強度の長期変動を知ることを目的としている。また、UV-AとUV-Bの強度比からオゾン全量が求められることを利用してオゾン全量の変動も求めている。

### 3. 大気温度観測装置の開発

従来から用いてきている観測装置にあわせて新たな装置の開発も進めている。2004年1月の鹿児島での観測では新たに開発したTilting Filter Photometerを用いた。近赤外線領域でのこの種の観測装置はわたしたちの装置が始めての試みである。2005年度においては波長分解精度を向上させる目的で新たなInGaAs赤外線検出素子を用いる。

# X線天体の研究とX線観測装置の開発

## 北本俊二、辻本匡弘

宇宙には地上では到底達成できないような、超強重力場、超強磁場、超高輻射場あるいは、超高温、超低温、超高密度、超高真空等のいろいろな極限的な環境が存在します。それら極限状態でどのような物理現象が繰り広げられているのか研究する事は、宇宙物理学の一つの大きな課題です。この研究室では、中性子星や、ブラックホールといった特殊な天体とその周りで起こっている現象、それから、星や星形成領域等の高温プラズマを研究しています。

X線による天体観測は主に人工衛星により行います。研究室では、人工衛星によって取得したデータを解析することにより、天体の研究を進めています。また、人工衛星に搭載することを目標として観測装置の開発も行っています。最高の研究をするためには、最高の観測装置で観測することが必要です。

### 1. ブラックホールや、中性子星の研究

中性子星は半径が10km程度であるのに、質量は太陽と同程度である大変小さく重い星です。その中性子星に物質が降り積もると、大きな位置エネルギーが開放され、高温となりX線で明るく輝きます。中性子星には1兆ガウスもの磁場を持つものがあり、そこでは物質は磁場により磁極に集中して降り積もります。そのため、特に磁極がX線で明るく輝きます。中性子星が自転しており、地球のように自転軸と磁軸がずれていれば、明るくX線で輝く磁極は見え隠れします。そのような中性子星を観測すると、X線強度が自転の周期で変動し「X線パルサー」と呼ばれるものになります。磁場の弱い中性子星では、降り積もった物質が爆発的な核融合反応を起こすことがあります。それは「X線バースト」と呼ばれます。ブラックホールに物質が降つてゆくと、やはり位置エネルギーが開放されて、高温になりX線で明るく輝きます。しかし、最終的には物質はブラックホールに吸い込まれてしまいます。あるいは、一部の物質は宇宙ジェットとして再び星間




図1. ブラックホール候補星GRS1915+105の時間変動。変動の時間のずれをエネルギーの関数で表した。エネルギーの高いX線ほど早く変動することを発見した。(Ohkawa, Kitamoto & Kohmura, 2005, ApJ, in press)

空間に吹き飛ばされることもあるかもしれません。このように、中心にブラックホールがある天体と中性子星がある天体を観測すればなんらかの違いがあるはずです。その違いはX線のエネルギースペクトルであり、X線の時間変動に現れると期待します。研究室では、そのような考えでいろいろなブラックホール候補星と中性子星であると考えられる天体をX線で観測し、極限環境でどのような物理現象が起こっているのか理解し、ブラックホールの証拠を掴もうと研究を続けています。

21世紀になってブラックホールに流れ込む物質の振る舞いの研究は新しい時代に入りました。物質が中性子星やブラックホールに落ち込む時は一般に降着円盤と呼ばれる円盤を形成します。この降着円盤は、位置エネルギーを熱や放射のエネルギーに変換する役割を担うもので、その性質は直接観測と結びつき、多くの研究が進められてきました。観測的にも日本の人工衛星「あすか」を始めとして米国の「チャンドラ」「RXTE」、欧州の「XMM-ニュートン」等の衛星によって、これまで考えられてきた標準的な降着流のモデルでは説明できないような振る舞いが見えてきました。特に降着流の量が多くなると、降着円盤はいろいろな様相を示すことが観測的に知られるようになってきました。我々のグループは、X線のエネルギースペクトルと時間変動を両方同時に解析することで、降着円盤の様子を解き明かそうとしています。図1はブラックホール候補星 GRS1915+103 の観測データから時間変動を解析して発見した、エネルギーが高いほど早く変動する現象を示したものです。

また、我々銀河系の外にある銀河の中には、X線や電波等で特に明るい中心核を持つ活動的な銀河があります。クエーサー、BL Lac 天体、セイファート銀河と呼ばれる物がそうです。これらの中心核は活動銀河核(AGN)と呼ばれます。活動銀河核の中心には太陽の百万倍から数億倍の質量をもつ巨大なブラックホールが存在すると考えられています。さらに、これら活動銀河核の多くは宇宙ジェットと呼ばれる現象を示しています。宇宙ジェットとは相対論的な速度に加速され、まさにジェット噴射のようにたいへん方向が揃ったまま細く絞られたプラズマの流れです。しかし、いかにして相対論的にまでプラズマを加速できるのか、どうして方向が揃った美しいジェットが作られる

のか、あるいは、そもそもプラズマは陽子-電子なのか陽電子-電子なのか、といふいろいろな基本的な問題がわかつていません。この宇宙ジェットの問題に観測的にメスをいれる事、そして、活動銀河核に潜むブラックホールの存在の観測




図2. チャンドラ衛星が観測した3つの大質量星のX線エネルギースペクトル。たくさんの輝線が検出されている。(Yamamoto, Kitamoto, Takano, Kohmura 2005 submitted)。

的証拠を掴みたいと考えています。

## 2. 大質量星の研究

X線による天体観測の感度は飛躍的に向上しており、今では、ほとんどすべての天体からのX線が検出されています。言い換えれば、ほとんどすべての天体はX線を放射しており、高エネルギー現象をともなっている事を物語っています。大質量星というのは、字のごとく大きな質量の星です。それらもやはりX線を放射していることがもう30年も前にわかつていました。しかし、どのような機構でX線放射しているのか諸説が提案されているだけで、わかつていません。観測的な証拠が待ち望まれています。

ところで、宇宙に存在する元素は、主に星内部での核融合反応で作られたものです。宇宙の過去から現代に向かって重い元素がだんだんと作られているのです。大質量星は寿命が短いので、比較的最近（数千万年）に宇宙にあるガスが集まって形成された物です。従って大質量星の表面を観測してその元素組成を調べれば、その星が作られた比較的最近の元素組成を知ることができます。このように、大質量星の研究は宇宙の元素組成歴史の研究にもつながります。

私たちのグループは、米国の「チャンドラ」衛星で観測した大質量星の詳細エネルギースペクトルを解析することにより、X線発生機構の研究、さらに、元素組成に関する研究も進めています。図2には、解析している三つの星のX線エネルギースペクトルを示しました。

## 3. 星形成領域の研究

宇宙の分子雲の中のガスが集まり星が作られます。そのような領域から始めてX線を発見したのは、日本のX線天文衛星「あすか」です。恒星が形成される前の天体、すなわち核融合反応が起きていない天体を前主系列星と呼びますが、そのような天体がどうしてX線を放射しているのか、いまだ謎です。大規模な爆発現象等が観測されているので、おそらく、宇宙に存在する磁場が重要な役割を果たしていると考えられていますが、観測的にもっと調べる必要があります。もし磁場が重要な役割を果たしているなら、磁場の効果を考慮した星形成を理論的に考察する必要が出てくるかもしれません。また、濃い分子雲に包まれた星の赤ちゃんとも言うべき前主系列星の観測は他波長では大変難しくて、X線だけが天体そのものからの情報を引き出せると期待されています。私たちの研究室でも、星形成領域からのX線を調べて、どのようにして星が作られているのか解き明かそうとしています。

## 4. 超高精度X線望遠鏡の開発研究

研究室では、将来はブラックホールを観測的に「見てみたい」という夢があります。その夢に向かって、観測装置の開発研究を進めています。その一つは、究極のX線望遠鏡の開発研究です。X線は波長が短いので、小さい望遠鏡でも高角度分解能が達成できます。しかし、現在の



図3. Xmas計画で進めているX線望遠鏡の実験装置、長さ4.5mの真空槽が望遠鏡の鏡筒である。

X線望遠鏡の角度分解能はどれも原理的な限界にはほど遠いものです。それは、X線光学系の精度が不足していることが理由です。そこで、X線光学系の精度を追求することにより、格段に優れた角分解能を有するX線望遠鏡を開発しようと考えています。私たちの研究室では、これをX-ray milli-arc-sec (X-mas) Projectと呼んでいます。そのための光学実験と、X線実験を織り交ぜて、試行錯誤を続けています。そこでは、X線反射鏡の研究、X線反射鏡を制御する研究と多種多様な研究が含まれています。図3に実験室にある、X線望遠鏡の試作途中の写真を載せました。

## 5. X線検出器の開発研究

超高精度X線望遠鏡では、非常に位置分解能の高いX線検出器が必要となります。現在は主力検出器として、デジカメ等に使われている電荷結合素子(CCD)を使用し、また、その特性を調べています。特に望遠鏡の開発では、低エネルギーのX線を使うので、感度の高い裏面照射型のCCDを使用しています。そのCCDを使って画素より細かい位置分解能を出す方法を試してみたり、また、CCD内部での電子の振る舞いを実験から調べたりしています。さらに、カーボンナノチューブを使った、まったく新しいX線検出器の開発にも挑戦しています。

## 6. X線偏光検出器の開発研究

将来のX線観測で、新しい領域を打ち開くと期待されているのがX線の偏光観測です。X線の偏光状態を知ると、X線放射機構そのものの情報を引き出すことができます。また、X線源の幾何学的な形状についての情報もわかると期待できます。しかしながら、今は、X線での撮像観測、エネルギースペクトル観測、時間変動の観測が主であり、X線の偏光状態はほとんど観測できていません。

私たちは、グループとして得意な多層膜やCCDを応用して、X線偏光計の試作を進めています。いろいろ試行錯誤の途中ですが、将来天体観測に使えるようなものを作るよう、研究を始めたところです。

## 7. 物理天文教材開発

研究室では、物理学や天文学の普及教育のための活動も進めています。その一つが教材開発です。1昨年は、物理学の教材として独創的な重力定数測定装置、誘電率測定装置、比熱測定装置の開発を行いました。昨年度は、BSアンテナ等を使って、太陽からの電波を測定する電波望遠鏡を完成させ、太陽からのフレヤーを捕らえることに成功しました。図4に完成した望遠鏡の写真を載せました。今後もいろいろな教材開発や、実際に実験講座等の活動も進めて行きたいと考えています。

さて、本年2005年に宇宙科学研究所から打ち上げる予定の「ASTRO-E2」衛星のCCDカメラ(XIS)は、立教大学、大阪大学、京都大学、工学院大学、愛媛大学、MITそして宇宙科学研究所のチームで開発したものです。宇宙空間で観測する Astro E2 のイメージ図を図5に示します。2005年3月現在、打ち上げに向けて宇宙科学研究所で動作試験を進めているところです。この衛星が打ちあがれば、いろいろな天体から、今まで誰も見たことの無い大変高い分解能のX線エネルギースペクトルを取得できます。まったく新しい発見が期待されます。この衛星を使った観測もたくさん計画しており、2005年度は期待にあふれる年です。



図4. 太陽を観測する電波望遠鏡。BSアンテナとアマチュア用天体望遠鏡の赤道儀で作った。




図5. 2005年度にうち上げが予定されているASTRO-E2衛星。宇宙空間でブラックホールを観測する様子のイメージ図(ブラックホールがこんなに近くにあるわけではありません)。(宇宙科学研究所本部提供)

# 宇宙粒子線による太陽系・銀河系の研究

## 柳町朋樹

宇宙空間を超高速で飛び回っている原子核——宇宙粒子線の化学組成、同位体およびエネルギー・スペクトルの測定は、その起源、元素合成プロセス、加速過程、伝播機構などを解明する上で非常に大きな鍵を握っている。


現在までに測定された宇宙線の最高エネルギーは、 $10^{20}$  エレクトロンボルト(eV)すなわち 10 ジュール(J)を越えている。このように高エネルギーの原子核が私たちに衝突すれば、甚大なダメージを与えないではないはずだが、そのために怪我をしたとか障害が発生した等ということがないのは、地球が幾重ものバリアーに守られているためである。運動する荷電粒子は磁場から力を受けて進路を曲げられるが、地球が存在する太陽圏には、太陽から吹き出す太陽風と呼ばれるプラズマの流れによって太陽表面から引き出された惑星間磁場が存在し、太陽圏の外側から侵入する比較的エネルギーの低い宇宙線は、進路を曲げられ地球が位置する太陽圏の中心付近まで達することができない。それでも地球の近くまで侵入してきた高エネルギーの宇宙線の多くは、地球自身が持つ磁場——地球磁場に妨げられて地表まで降り注いでくることはない。この第2のバリアーも突破できるようなよりエネルギーの高い宇宙線から最後に私たちを守ってくれるものは、地球の大気である。水に換算すると 10m もの厚さの大気中に突入した宇宙線は、大気を構成する原子核と衝突して破壊される。もちろん破壊された後の残存物の中には地表まで到達するものもあるが、それらは分厚い大気を通過することができたもの、言い換えば大気中の物質との相互作用が極めて小さいものであるから、人体に及ぼす影響も小さい。

磁場を伴う2つのバリアー領域は、外から侵入してくる粒子を阻止する一方、その内部で運動する粒子に磁場の強さに応じた様々な影響を与えており、それぞれの領域特有の現象を出現している。地球磁場はそこに衝突してくる太陽風プラズマとの相互作用により、明確な境界が形成され地球磁気圏という領域を作り出している。この領域では、そこに取り込まれた太陽風プラズマ粒子やイオン化された地球大気を構成する原子が、磁気圏の磁場との相互作用によって運動エネルギーが  $10^3$  から  $10^5$  eV 程度まで加速される。

また、常に秒速 400~500km 程度の外向きの太陽風が吹いている太陽圏では、ときどき秒速 600~700km に達する高速の太陽風が吹き出して前面の低速太陽風を圧縮し、この圧縮が十分成長する太陽・地球間の2~4倍の距離のところで、低・高速太陽風の境界面で衝撃波が形成される。この領域では、やはり磁場との相互作用によってイオン化された原子が  $10^7$  eV 程度のエネルギーまで加速されている。低・高速太陽風が吹き出す太陽表面上の位置は、ある程度の期

間固定されている。したがって、粒子加速が生じている衝撃波領域は、太陽の自転とともに約27日周期で太陽の周りを回転することになるため、この領域は共回転相互作用領域と呼ばれている。この領域で加速された粒子を地球を周回する人工衛星で観測すると、やはり27日周期で高エネルギー粒子の増加が見られることになる。

下図は、1993年8月からの8ヶ月間に渡ってGEOTAIL衛星で観測されたHeイオンの強度変化を示している(最下段の強度が大きく変化していないデータは酸素イオンである)。図中の上下に分かれた実線は、低・高速太陽風の境界面が地球を通過した1994年3月7日の10時を基点とした太陽自転周期を表している。多少ずれているところもあるが、線分の切れ目を始点としてHeイオン強度が増加していることがわかる。



星間空間と呼ばれる太陽圏の外に存在するイオン化されていない中性原子は、惑星間磁場に妨げられること無く太陽圏の奥深くまで入り込み、太陽の紫外線や太陽風プラズマ粒子との衝突によってイオン化され、10<sup>8</sup>eV程度のエネルギーまで太陽圏内部で加速されて宇宙線異常性分として観測されている。

太陽圏の外側には星間空間と一言で呼ばれる空間が、銀河系の縁まで広がっている。星間空間の大部分は、 $1\text{cm}^3$ あたり水素原子核が1個存在する程度の太陽圏よりも希薄な空間であるが、そこは超新星の爆発が起きたり、その名残りである大規模な磁場の擾乱が存在する大変活動的な場でもある。このような領域でイオンは10の10数乗eVのエネルギーまで加速され、およそ1千万年に渡って銀河系の大規模な磁場に閉じ込められている。

現在われわれは、1992年にNASAの協力を得て打ち上げられた、宇宙科学研究所の人工衛星GEOTAILによる観測データの解析に力を注いでいる。この衛星には他大学との共同研究により開発した4種類の検出器が搭載されており、地球磁気圏粒子から銀河宇宙線までの広いエネルギー範囲にわたる宇宙粒子線の観測を行っている。これらの観測データの解析から銀河宇宙線の伝播機構、宇宙線異常成分、太陽高エネルギー粒子の加速・伝播機構、磁気圏プラズマの振る舞い、太陽風や太陽高エネルギー粒子と地球磁場との相互作用等の研究が進行中である。

日本の宇宙科学研究所によって2000年に打ち上げられた火星探査衛星には、私たちが開発した検出器が搭載され、磁場が極めて弱い火星における太陽風と火星大気との相互作用を探る研究を期した。しかし、昨年の12月に衛星を火星周回軌道へ投入することができなかつたことは、非常に残念である。また、月周回衛星に宇宙粒子線検出器を搭載し、銀河宇宙線、太陽高エネルギー粒子あるいは太陽圏で加速された粒子の観測や、スペースシャトルを利用した通常の熱核融合反応では生成されない鉄より重い宇宙線の観測等の計画が進められている。

# 地球・惑星磁気圏と惑星間空間の飛翔体による直接探査

平原 聖文、藤川暢子

太陽コロナから加速され流れ出す太陽風は地球にとっては超音速のプラズマ流である。その平均速度は秒速 400km 程度であり、1~10 個/cc 程度のプロトン・ $\alpha$ 粒子・電子が主成分である。この太陽風が磁気(双極子型の地球固有磁場)の壁で守られた地球超高層大気領域(磁気圏・電離圏)に吹き付けた時、様々な電磁場・プラズマ現象が起こる(図 1)。これらの幾つかは、スペースシャトルや宇宙ステーションの乗組員だけでなく、地上にいる我々でも実際に体験したり、時には驚異・脅威となる場合がある。例えば、北極圏・南極圏ではオーロラ現象(写真 1)が見られたり、極地方の電離圏を流れるオーロラ電流により様々な地上設備に誘導電流が発生し、変電設備の故障、大停電や原油・天然ガスのパイpline の破損・腐食、等が引き起こされる。




図 1: 地球近傍の宇宙空間プラズマの概念図  
太陽(左)から吹き出す太陽風と地球磁気圏(右)



写真 1: 幾重にも折り重なったオーロラの例

地球近傍の宇宙空間で起こっている現象は実に興味深いものであり、また、宇宙の 99.9% 以上を満たす宇宙プラズマの普遍的な素過程そのものである。例えば、超音速の流体(太陽風)中に障害物(地球磁場)があるのだから、地球を取り囲む様に衝撃波が生成される。衝撃波通過時に太陽風は減速され、流れの方向が地球磁気圏を避ける様に変わる。この時、減少した運動エネルギーは内部エネルギー(熱エネルギー)へと変換される。この辺りで起こっている現象は、磁化プラズマの天然の実験室として格好の研究対象であるが、まだ地球磁気圏外なので地上からはほとんど探知出来ないし影響もないで、人工衛星等を使った直接観測が主流である。宇宙プラズマ中の衝撃波の物理は、昨今の高エネルギー天文学でも重要視され広い分野で理論的・観測的研究が進んでいるが、プラズマダイナミクスを直接観測出来る地球・惑星近傍での我々の衛星観測計画は、極めて有効な手法といえる。

衝撃波を通過した太陽風の一部は地球磁気圏の外側境界層へと吹き付ける。しかし、太陽風は荷電粒子の集合体であるため地球磁場をたやすくは横切れない。ローレンツ力のため磁力線の周りにくるりと向きを変えられるからである。従って、磁気圏境界層では、吹き付ける太陽風の圧力(動圧)と地球磁場の磁気圧が「せめぎ合い」、それらがつり合う事で磁気圏の形がほぼ決定される。それら以外にも、太陽風プラズマは太陽面から延びる磁力線を運んでくるし、内

部(熱)エネルギーもあるので、それらも境界層を変形させる圧力となる。また、地球磁気圏内にも太陽風ほど密度は高くないものの、より高温(数千万度)の磁気圏プラズマが存在し、地球磁場と共に太陽風からの圧力を支えている。

それでは、磁気圏境界層では太陽風と地球磁気圏との圧力が均衡し太陽風は跳ね返されるだけか、というと磁場中での宇宙プラズマの振る舞いはそれほど単純ではない。太陽風が運ぶ惑星間空間磁場と地球固有磁場の関係を見てみよう(図 2)。それらは太陽風が境界層にぶつかる前はつながってはいない。しかし、境界面に押し寄せた後(図 2 の 1, 1' )、そこで太陽風磁場と地球磁場が「せめぎ合い」を続けるよりは、お互いの磁力線がつなぎ換わり、拮抗している領域から一緒になって押し出される方がプラズマや磁力管の輸送には都合がよい(図 2 の 2)。この状況は、お互いの磁場の方向がほぼ反対方向を向いている場合に起こりやすく、「磁力線の再結合(リコネクション)」と呼ばれている。最近では太陽フレアやより遠くの天文現象でも同じ原理が働いていると考えられる様になってきた。

この様に、地球磁気圏境界層で太陽風磁場と地球磁場がいったん再結合されてしまうと、太陽風はその磁力線に沿って地球磁気圏の昼側から夜側の磁気圏尾部領域へと進入出来る様になる(図 2 の 5)。このプラズマの振る舞いは、小川に置かれた小石周辺の水の流れとよく似ている。その結果、太陽風プラズマは地球夜側の磁気圏へとため込まれる。この領域はプラズマシートと呼ばれ、熱いプラズマの貯蔵庫となっている。

プラズマシート中の高温プラズマはその後も様々な過程・領域を経る。一部は地球双極子磁場の磁力線に沿って地球極域に降り込み、華麗なオーロラ発光現象(写真 1)を見せてくれる。他の一部は数 MeV 程度まで加速され、気象・放送・通信などの分野で使われる人工衛星の電子回路に悪影響を及ぼす。またあるものは地球磁気圏内に蓄積し切れないほど大きなエネルギーをもたらすので、磁気圏尾部で磁気圏磁場同士の再結合を起こし(図 2 の 6, 6' )、熱いプラズマを含んだ磁力線を丸ごと太陽風領域へと放出する事で磁気圏全体のエネルギー収支のバランスを維持する。この際に地上ではオーロラが現れたり、電磁場が乱れるのが観測される。




図2:磁気圈前面(1)と尾部(6)での磁力線再結合



図3: ISTP の科学探査人工衛星群

この様なダイナミックな太陽風・磁気圏プラズマの物理機構を調べるため、我々はプラズマ観測器を始め、高エネルギー粒子観測器、磁場・電場計測器、プラズマ波動観測器を開発し、1989年にEXOS-D(あけぼの)衛星を、1992年に日米共同プロジェクトとしてGeotail衛星を打ち上げ、観測を続けている。因みに、地球電離圏から上層の地球大気・磁場の勢力圏をexosphere(外圏)、地球夜側に伸びる細長い磁気圏をgeotail(地球の尾)と一般に呼んでいる。この様な大規模な観測計画は、日本だけでなく米国・欧州・ロシア等と国際共同体制で行われており、International Solar-Terrestrial Physics Program(ISTP)による科学探査人工衛星群が打ち上げられ研究されている(図3)。

次に、地球から見えるプラズマ現象として、極域でのオーロラを考えてみよう。オーロラ発光は、プラズマシートから地球向きに大規模な静電場で加速されて降り込んでくる電子が、高度100kmの電離圏下部に達するまでに地球大気の原子・分子と衝突を繰り返し、それらを励起・発光させる事で説明される。ここで、電子が地球方向に静電場で加速されるなら、地球電離圏に豊富に存在する水素・酸素やヘリウムなどの正イオンは同じ電場により反対方向にプラズマシートへと加速され地球の重力圏を脱出している事が予想される。実際、地球大気は太陽光で電離されイオンとなつた後、極地方ではオーロラ電子と逆向きに地球から大量に逃げ出している事が、やはり衛星観測で明らかにされつつある。

さて、アラスカやカナダ北部、スカンジナビアで観光客の目を楽しませるオーロラとそれを光らせる電子の微細な空間分布・構造を解明するために、我々の研究グループでは小型の人工衛星計画が進行中である。この衛星はINDEX衛星と呼ばれ(図4)、宇宙航空研究開発機構のH-IIAロケットにより、他の大型衛星と一緒に2004年度に打ち上げられる予定である。理学観測機器開発の中心となっているのは、立教大学、宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究所本部、国立極地研究所、それに東北大学である。




図4:オーロラ観測中のINDEX衛星の想像図




図5:日欧共同の水星探査探査機の想像図

この様な太陽風と惑星との相互作用は、磁場がない、あるいは弱い惑星の場合は一体どうなるのだろうか？また、固有磁場はあるが濃い大気がない惑星の場合はどうであろうか。これらはそれぞれ金星・火星の場合と水星の場合に当てはまる疑問である。現在、日本でも宇宙科学研究所が中心となって様々な惑星探査計画が進行中である。日本初の火星探査衛星 Planet-B(のぞみ)衛星は、1998 年に鹿児島県内之浦町の宇宙空間観測所から宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究所本部の M-V ロケットにより打ち上げられたが、残念ながら火星周回軌道に投入される事が出来なかった。しかし、太陽風と火星上層大気との相互作用を調べる宇宙プラズマ物理学、更には惑星大気進化の視点からも火星探査の継続は重要であり、現在、米国・欧州が精力的に探査計画を実施している。日本も今後の新しい火星探査の可能性を議論する必要があるだろう。その他に、以下の通り、将来の科学探査人工衛星計画も数多く計画され、他惑星や月へと研究対象を広げつつある。

1. ヨーロッパ宇宙機関(ESA)の水星探査計画(BepiColombo 計画：図 5)への協力として、  
2012 年の打ち上げを目指し日本で計画中の水星磁気圏探査衛星 (Mercury Magnetospheric Orbiter: MMO)
2. 2009 年頃打ち上げ予定である日本独自の金星気候探査衛星 (Planet-C)
3. 2006 年打ち上げ予定の月周回探査衛星 SELENE

我々の研究グループは、これまでの探査衛星計画での観測器開発・データ解析の経験を活かし、水星・金星や月、それに将来は木星などへも探査機を送り込む事を考えており、21 世紀の科学研究のフロンティアを開拓しつつある。この様な国際的大規模プロジェクトに代表される我々の研究体制は立教大学、宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究所本部(神奈川県相模原市)や国立極地研究所(板橋区)、東京大学、京都大学、東北大学、九州大学、東京工業大学、名古屋大学、早稲田大学などと共同で行われており、その研究内容は、衛星計画の立案・観測機器の開発・データ解析・モデリング・数値シミュレーション等に代表される。特に宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究所本部は、国立大学・私立大学を問わず一般の学部生・院生に広く門戸を開けており、立教大学からも衛星計画に参加出来る。宇宙科学に関連した卒業研究や修士・博士課程での研究に興味があり、「好奇心」と「体力」と「知力」、それに「やる気」を持った人が、衛星搭載用観測器の設計・試作・開発やデータ解析・モデリングに取り組むのを期待している。

# 実験技術員研究紹介

# 放射線計測エレクトロニクスの研究

実験技術員 村上浩之

主な研究テーマは放射線計測の為のエレクトロニクスシステムの研究ですが物理実験を行うにはエレクトロニクスの力を利用しなければ何も出来ないのが現代の物理実験の姿です。特に加速器を利用する原子核実験、素粒子実験や気球や人工衛星を利用する宇宙線実験、X線・赤外線天文観測、地球・宇宙空間物理観測等では一人で実験の全てを行う事は出来ないので数人から数百人のグループで実験を行います。その中でエレクトロニクスは主要な実験技術です。最適なエレクトロニクスの技術を使用出来るか否かが実験の成否を決める場合が多く見られます。

物理実験で重要な事は起こった物理的な現象をありのままに捉える事です。このためにそこで起こった現象を物理量として捉えそれを電気的な信号に変換するセンサー(検出器)、そこからの電気信号を増幅や変換などを行い目的の物理量に対応した電気信号を取り出すアナログ信号処理、アナログ信号をデジタル信号に変換するアナログ-デジタル変換(A-D変換)、デジタル信号から目的とする情報を表示(記録等)を行うデジタル信号処理など行って定量的に目的とする物理量を取得します。実験によって異なりますがセンサーの数は1個から数千万になります。センサーの数が多いほど大規模な実験となります。

気球や人工衛星等の飛翔体を利用する実験では物理量の取得だけでなく取得可能なデータ量の制約、消費電力・発熱量の制約などが加わります。これらの制約を全て満足しないと意味のある実験データを取得する事は出来ません。これらの実験に使用するエレクトロニクスシステムは市販されている物はほとんど無く自らの手で作り出す必要があります。市販されている実験装置だけでは他人の実験を真似をする(実際には真似をするのも困難)程度の事しか出来ません。エレクトロニクスの技術力が無い実験グループはオリジナルな実験を行うのは困難です。

立教大学の物理実験グループは放射線計測に関する実験技術を利用して他大学や研究所と多くの共同研究プロジェクトに参加しています。

## 1. 宇宙線高エネルギー電子の観測。

CALET と名前を付けられた高エネルギー電子観測装置は宇宙ステーションの暴露部に搭載される約 1.5 トンの観測装置です。基礎的な開発は進んでいますが本格的な観測装置の開発はこれからです。観測出来るまでには 10 年以上掛かるかも知れません。10GeV から 1TeV までの高エネルギー電子は気球に搭載して観測に成功しています。2004 年の初めには南極周回気球で約 2 週間の観測を行いました。立教大学はエレクトロニクスシステムに関し全ての基本設計を分担しています。

## 2. 重イオン核物理(反応)実験

理化学研究所で行っている不安定核ビームを利用した実験で立教関係の人と技術が重要な役割を担っています。半導体検出器の信号処理に関するエレクトロニクス技術は優れています。

### 3. 放射線計測エレクトロニクス基本回路の開発。

現在使用されている放射線計測に使用されている市販のエレクトロニクスシステム（モジュール）は30年以上前に開発された物です。しかし、生産されている部品の体系が大幅に変化して今までの市販のモジュールは近々生産中止になります。開発コストの関係で新たなモジュールが従来のメーカーから発売される見込みはありません。現在の部品体系に適合したモジュールシステムを個別の実験グループで開発する必要があります。メーカーには実験に適したモジュールを開発する力は無いのでメーカーに仕様を示して発注する事は出来ません。このままでは実験が出来なくなるので実験グループ内で開発を行い生産をメーカーに委託出来るように基本回路開発と人材の育成を行う必要があります。

上記の2と3に関してM1の町田君にエレクトロニクス技術の継承を期待していますが継続的に人材を育成していくかないと放射線計測エレクトロニクス技術の継承が途絶えてしまう危険性が大きいので積極的な人材育成が重要な課題だと思っています。

# 加速器実験、多価イオン実験、宇宙観測実験・研究の支援

実験技術員 須賀 一治

## 1. Cockcroft-Walton型 荷電粒子加速装置（加速器）の管理。

（4号館に「加速器」があります。 理学部内で最大規模の実験装置です。

近年、色々なところを修繕し、リニューアル・オープン！）

### 最近の主な実験課題

「GSO Ce シンチレーターの Proton 発光測定」－大学院研究実験(小泉先生)

「固体金属内の原子核反応」－卒業研究実験(家城先生)

「シリコン検出器の不感層の測定」－卒業研究実験(栗田先生)

「固体金属内における重水素密度分布の測定」－卒業研究実験(家城先生)


など

(放射線に関係するので、立入り前に特別な教育講習や特別な健康診断を受けて、許可された者でなければ、加速器の「実験」を見る(参加する)事はできませんが、加速器室内・装置の見学は一般の方でも可能ですが(実験していない時)に限る)。 見学希望者は申込んで下さい(なるべく何人かでまとまって)。)



Cockcroft-Walton型 荷電粒子加速装置

イオン源 高圧ターミナル



同 重イオン衝突実験コース

微小反応断面積測定実験コース

## 2. 高エネルギー加速器研究機構(KEK, つくば市)の放射光科学研究施設(PF)において

「X線の短時間変動とX線による直接撮像で迫るブラックホールへの物質流入の研究」


(文部科学省 科学研究費補助金 特定領域研究, 北本先生)実験。

－透過型多層膜偏向素子の評価や、X線天文観測衛星 ASTRO-E2 (2005年度打上げ予定)搭載のX線CCDカメラ(XIS)用 可視光遮断フィルター(OBF)の評価。

[ ⇒ 北本先生のページを参照。 ]



高エネルギー加速器研究機構(KEK)  
放射光科学研究施設(Photon Factory : PF)



同 ビームライン BL-11A

### 3. 多価イオン測定装置 実験

「低エネルギー電子および多価イオン－希ガス固体表面の相互作用の実験的研究」

(小泉先生, 平山先生)

－脱離原子・イオンの測定システムの構築, 高イオンビームラインの改造(予定)


[ ⇒ 小泉先生, 平山先生のページを参照。 ]

### 4. 太陽観測衛星「ようこう」ミッション(1991年から2004年4月まで)

(「ようこう」には、立教大学が責任担当の 硬X線スペクトル計(WBS > HXS),  $\gamma$ 線スペクトル計(WBS > GRS) 他を搭載(吉森先生)。)

－人工衛星の観測計画立案・同オペレーション, データ解析ツールの開発整備。

[ ⇒ 吉森先生のページを参照。 ]



太陽観測衛星「ようこう」想像図



X線天文観測衛星 ASTRO-E2 想像図

[共に (C)宇宙航空研究開発機構(JAXA) 宇宙科学研究本部(ISAS) ]

# 大気光地上観測装置および物理実験装置の開発と製作

実験技術員 関口宏之

最近1年ほどの間に開発・製作した大気光地上観測装置（Tilting Filter Photometer）と物理実験装置（簡易型回折格子分光器）について報告する。

## Tilting Filter Photometer

超高層大気の研究グループは、OH（3-1）帯夜間大気光から高度90km付近のメソポーズ領域の温度の導出を目的として継続して観測を行っている。

定常的な観測ベースである立教大学池袋キャンパスでは液体窒素冷却のGe素子を光センサーとしてフィルター放射計による観測を行っている。この装置は高感度を有していて、他の観測装置の基準となる性格を持たせている。液体窒素を必要とし、3ないし4時間毎にその補充を行う必要があるため、様々な場所での観測には向いていない。

こういった状況で、また長期間継続しての観測を想定して、ほぼ無人で連続観測が行える装置としてTilting機能を取り入れた新たな装置を開発した。装置の内部を図1に示す。透過中心波長1547nmの干渉フィルター（直径50mm）を垂直から30度まで傾けることで1510nmから1547nmの波長範囲をカバーし、OH(3-1)帯のP枝の3本のライン強度を測定する。光センサーは電子冷却方式のInGaAs素子（直径5mm）を用いている。垂直から30度までのスキャンを30秒で行うモードを基本とする。

装置の制御とデータの取得はノートパソコンで行い、観測開始日から終了日までの日出・日没時刻を入力しておけば、自動的に観測が開始される。

本装置を用いた観測は2003年秋から開始した。2004年1月には鹿児島での観測を行った。それは、大気光波状構造キャンペーン（WAVE2004）のためのロケット実験との同時観測が目的であった。

近赤外線領域でのこの種の観測装置はわたくしの装置が初めての試みである。

現在、池袋キャンパスで毎月、新月を挟んで前後5日、合計10日間の夜間観測を行っている。

装置の重量は20kg程度であり、外形サイズは33×23×44cm<sup>3</sup>である。




図1 Tilting Filter Potometer の構造

## 簡易型回折格子分光器（および解析・表示ソフト）

最近ではいろいろな色の発光ダイオード(LED)が製造されていて、日常生活の中で電気製品、信号機または掲示板にと広く使用されている。青色発光ダイオードが話題になったこともあり、3年生の物理実験「半導体」の実験項目のひとつとして、発光ダイオード(LED)を取り上げた。それらの波長スペクトルを測定する目的で製作したのが本装置である。使用した透過型の回折格子の格子の数は1000本/mmである。分光器の概観を図2に示す。(外形サイズは22×30×14cm)

設計に当たって、次の2点に留意した。

- 1 スペクトルを「目視」できること。
- 2 その「強度スペクトル」を測定できること。

図2の概観図で側面の黒い四角の部分が入射スリットである。回折格子に垂直に入射した光は、上から見て左右対称に分散する。一方にはC-MOSイメージ・センサーを置き、他方には鏡を置き外部からスペクトルが目視できるようにした。

測定試料として色の違うLEDを9個用意した。

図3にスタンドとLEDを示す。

分光器



図3 発光ダイオード

C-MOSイメージ・センサーからのビデオ信号はビデオ・キャプチャーを通して静止画(bmp形式)としてパソコンに取り込まれる。測定例として図4に蛍光灯とピンク色に光るLEDのスペクトルを示す。蛍光灯のスペクトルでは、5本の水銀のラインが見える。これらの波長はわかっているので、横軸(ピクセル)と波長の関係が求まる。ピンク色に光るLEDのスペクトルには2つの離れた波長にピークがあるのがわかる。それらは、青と赤の光である。青と赤の光の合成でピンク色に見えているのである。



図2 簡易型回折格子





図4 スペクトルと強度分布  
上は蛍光灯、下はピンク色のLED

# ハイテク・リサーチ・センタープロジェクト

現在、理学部ではハイテク・リサーチ・センター整備事業という共同研究プログラムが2001-2005年の5年計画で進行中です。これは物理学科だけのプロジェクトではありませんが（主体となる研究組織は先端科学計測研究センター）、物理学科のスタッフが中心になっている研究計画も多いので紹介します。大学院生・学部卒研生もこのプロジェクトに参加することができるので、興味のある方は担当教員におたずねください。

## **研究目的**

計測は科学の実験的研究の基盤をなす。その技術的な進歩が新しい現象の発見につながり、研究の発展に大きな貢献をしてきた。一方で、新しい計測法の開発は、生産技術の進歩の重要な一翼をになうという意味で、産業基盤技術の一つと位置づけられる。先端科学計測研究センターは、立教大学理学研究科を中心に発展してきた数学的、物理的、化学的、情報科学的手法を総合し、他研究機関、企業との協力のもとに、新たに組織的・系統的に情報処理を含む科学的計測法について最先端の学際的研究を行い、その成果の科学的研究への適用を行うのみならず、新しい産業基盤技術への応用を図ることを目的としている。

本整備事業では、2つの研究開発プロジェクトをたてる。一つは、「光・イオン計測法の研究および可搬型測定器の開発」で、赤外線から $\gamma$ 線に至る広い波長範囲の光、keVからGeV領域のイオンという広い意味での放射線に対する測定技術、手法を研究する。また、その成果を用いて、測定対象物を研究室へ運ばずに現場で高精度の測定を可能にする可搬型機器を開発する。もう一つのプロジェクト「高度相関データ処理」では、実時間処理技術の研究と数学的・物理的手法の適用によって、大きなスケールの相関データ処理を高速に行う技術を開発する。次世代の計測では、測定子材料、高速応答電子回路をはじめとするハードウェアー研究と、データ処理での情報科学的研究をより有機的に組み合わせることが求められるが、この2つのプロジェクトの成果を組み合わせることにより、総合的な計測技術の進展を目指す。

これらの開発は、理学研究科での研究に密接に関連しており、人工衛星搭載機器技術の応用による可搬型測定器の開発、行列計算や場の理論による暗号理論の研究とそのデータ処理への応用など、基礎的な理学研究の成果によって、応用的技術の研究を行うという点に特徴がある。これらの研究は、先端科学計測研究センターでの研究の中核をなすものとしてたてられており、その進展によってセンターの目的である科学的計測技術の産業への応用に対してユニークで大きな貢献をすることを目指す。また、本計画により、他研究機関、企業との協力が進展し、それをきっかけとして協力関係がより広い領域に拡がり、新たな研究開発課題を創出することに繋がると期待される。

## **研究組織**

[2005年度先端科学計測研究センター研究員]

センター長 小泉哲夫

運営委員 小泉哲夫、筧三郎、北本俊二、村田次郎、柴崎徳明、枝元一之、池澤泰成  
研究員

数学科：佐藤文廣、木田祐司、筧三郎、大杉英史、山田裕二、横山和弘

物理学科：小泉哲夫、家城和夫、平山孝人、栗田和好、村田次郎、柳町朋樹、北本俊二、  
平原聖文、柴崎徳明、田中秀和、矢彦沢茂明、須佐元、大須賀健

化学科：佐々木研一、漆山秋雄、関根強一、鈴木正男、池澤泰成、枝元一之、加藤中英  
実験技術員：関口宏之、村上浩之、須賀一治

P D：藤川暢子、福地知則

訪問研究員：下浦亨(東大NSRC:家城)、本林透(理研:栗田)、谷口一雄(大阪電通大:佐々木)、  
清水成宜(日立成:小泉)、幸村孝由(工学院大:北本)、  
浅村和史(宇宙航空開発研究機構:平原)、  
高島健(宇宙航空開発研究機構:柳町)

R A

梅野泰宏(物D1)、関和雄一(物D2)、牧秀樹(物D2)、若林裕也(物D2)、渡辺圭太(化D3)

## 進行中の研究テーマ

1. 光・イオン計測法の研究および可搬型測定器の開発(研究代表者 小泉)

### A 高性能光センサー開発

超高感度 $\gamma$ 線相関測定法の開発(本林、村上)

生物化学試料に対する微弱ラマン光測定技術(漆山)

パルサ一天体による超高精度時間標準(柴崎)

回折限界を目指した精密X線光学系の開発(北本、関口、須賀、幸村)

位置検知型高分解能放射線検出器の開発(下浦)

GSOシンチレータを用いた高性能サーベイメータの開発(村上、清水、小泉)

### B 精密イオン測定法

低速多価イオンと原子・分子・クラスター相互作用(小泉、須賀)

多価イオンと希ガス固体・表面の相互作用(平山、須賀)

半導体検出器による高エネルギーイオンの分析(柳町、高島)

偏極陽子衝突実験での核子スピinn構造の解明(栗田)

ベータ崩壊精密観測実験用検出器の開発(村田)

### C 可搬型測定器開発

小型・軽量化された宇宙空間荷電粒子のエネルギー・質量分析技術の確立と一般計測分野の応用(平原、藤川、浅村)

可搬型蛍光X線分析・X線回折共用装置による環境パラメータ評価方法の開発(佐々木)

可搬型蛍光X線分析・X線回折共用装置の考古試料分析への実用試験(鈴木)

可搬型蛍光X線分析・X線回折共用装置の開発(谷口)

可搬型蛍光X線分析・X線回折共用装置による電池負極表面分析への実用試験(関根)

## 2. 高度相関データ処理(研究代表者 佐藤(文))

組合せ論約大量データの処理法の検討(佐藤(文))

分散処理システムの構築および素因数分解アルゴリズムの実装(木田)

非平衡系での形態生成のシミュレーション(筧)

符号理論に現れるある0次元イデアルのグレブナー基底(大杉)

情報の場の理論的研究(矢彦沢)

高速実時間データ収集系の開発(家城、福地)

多粒子生成過程に対する多重相関データ処理法(田中)

異種並列計算機による銀河形成過程の数値シミュレーション(須佐、大須賀)

事業発足後4年が経過し、研究は順調に発展しています。2003年度には文部科学省における中間評価が実施され、幸いにも当事業は最高の評価を受けることができました。外部研究機関との共同研究も理化学研究所や、東大CNSとの共同研究のほかに、都立産業技術研究所や日立化成株式会社と正式に共同研究契約を結び研究が進行中です。2005年度は最終年度にあたり、結果のとりまとめを行わなければいけません。また次期の共同研究計画の検討も始まっています。13号館4階にハイテク・リサーチ・センター整備事業および学術フロンティア推進事業担当の事務室があります。そこにハイテク関連の資料(研究会の報告、業績報告書など)が置いてありますので、興味のある方はこちらにもどうぞ。また先端科学計測研究センターのホームページもご覧ください。

先端科学計測研究センターホームページ：

<http://www.rikkyo.ac.jp/~z3000145/HighTech/index.htm>